

KÉTFÁZISU PLAKKFESTŐ FOLYADÉK

dr.Pintyéné dr.Hódi Klára, dr.Gorzó István

SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet, 6720 Szeged, Eötvös u.6.
és Fogászati és Szájsebészeti Klinika, 6720 Szeged, Lenin krt.
64-66.

A csaknem láthatatlan fogágybetegséget és fogszuvasodást előidéző plakk megfestésének lehetősége jelentősen segíti a fogorvost a betegek felvilágosításában, a gondos szájhigiénéiára való ösztönzésben.

A szerzők által javasolt festék alkalmazásával meg lehet különböztetni egymástól az ugynevezett "fiatal"/48 óránál nem régebben képződött/ és "régibb" plakkot. A fiatal plakk pirosra színeződik, míg a régi kékre, így azok egyszerűen elkülöníthetők egymástól. A szinkülönbség a demonstrálás lehetőségével megkönnyíti a betegek megtanítását a helyes fogmosásra. Az oldat gyorsabban színez mint a tablettá, ezért a rendelőben jelentős időmegtakarítást eredményez. Előállításuk egyszerűbb és olcsóbb is mint a tablettáé. Az összetételben szereplő mindkét festék engedélyezett étel-színezék, így semmiféle káros hatásuk nincs.

Az oldat alkalmazását elsősorban fogorvosi rendelőkben javasoljuk. Használat előtt az ajkak zsiros krémmel kell bekenni. A festék felvitele az oldatba mártott vattagombóccal történik. Az elszíneződés foka a festék expozíciós idejétől és a plakk vastagságától függ. A festék segítségével demonstrálni lehet a beteg számára, hogy 48 óránál régebbi baktérium lepedék is található a szájában.

Iktatási száma: 8/1985.