

Adatok Magyarország zuzmó vegetatiójához. II.
Beiträge zur Flechtenvegetation Ungarns. II.

Írta : } V. Gyelnik (Budapest)
 Von: }

(Beérkezett 1927. V. 31.)

Ebben a második adatközlésemben hazánk több vidékről gyűjtött és egyesített anyagomból közlök egy részt. Már nem követem azt a módszert, amit első közleményemben követtem, hogy t. i. megyék szerint dolgozom fel anyagomat, hanem az összes feldolgozatlan anyagomat nemzetiségek szerint rendeztem, dolgozom fel és közlöm. Ezzel párhuzamosan megkezdtettem a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Növényrendszertani Intézete herbariumának a feldolgozását is. Meglehetős nagy feldolgozatlan anyag fekszik ott, amit Dr. Tuzson János egyetemi professor Úr engedélyével dolgozok fel. Támogatásáért e helyen is köszönetet mondok. Ebben a dolgozatomban úgy saját, mint eddig feldolgozott egyetemi anyagot egyesítve adom közre. Ahol a gyűjtő nevét az enumeratioban nem tettem ki, azt én gyűjtöttem, ahol pedig a herbarium nincs jelezve az a zuzmó az én herbariumomban foglal helyet.

Az egyes lelőhelyek pontos megállapítása a sokszor hiányosan kiállított névjelzők miatt nehézségebe ütközött. Például Nagy B. gyűjtésében sokszor előfordul a „mons Vulkán“ jelzés, egyéb semmi sincs a névjelzön. Mivel Vulkán hegy több van Magyarországon, nehéz megfejteni melyik az, amelyen Nagy B. gyűjtött. Mivel Nagy B. gyűjtésében a Vulkán hegyi névjelzön kívül csak még „Pareng“ jelzést névjelző van és mivel Pareng Hunyad megyében van és ugyanott van egy Vulkán hegy is, tehát a legvalószínűbb, hogy növényét a hunyadi megyei Vulkán hegyen gyűjtötte.

A hazánkra nézve új adatok (46) * csillaggal jelölvék.

Rövidítés: U. = budapesti Tud. Egyet. Növényrendszertani Intézete.

Diese zweite Datenpublikation umfasst einen Teil des von mir an mehreren Gegenden Ungarlands gesammelten und vereinigten Flechtenmaterials. In Folgenden habe ich die Methode nicht befolgt was ich in meiner ersten Publikation befolgte, nämlich, dass ich mein Material nach Comitaten aufarbeitete, sondern meine ganzes nicht aufgearbeitetes Flechtenmaterial ordnete ich nach Gattungen, und nach Gattungen bearbeite und veröffentlichte ich es. Paralell mit der Aufarbeitung meines Materials ging ich auch an die Aufarbeitung des Herbars des botanischen Instituts des budapester Pázmány Péter Universität. Eine ziemlich grosses unbestimmtes Material fand ich dort, dessen Aufarbeitung ich mit der Einwilligung des Herrn Prof. Dr. Tuzson J. anfing. Für seine Unterstützung danke ich auch hier. Also in dieser Publikation veröffentlichte ich so meine wie die an der Universität aufgearbeiteten Daten. Wo ich in der Enumeration die Namen des Sammlers nicht schrieb das habe ich gesammelt, und wo ich das Herbar nicht erwähne das kann man in meinem Herbar zu finden.

Die Festsetzung einiger Fundorte war vielmals wegen mangelhaft ausgefüllten Scheden schwierig. Z. B. zwischen den von Nagy B. gesammelten Flechten kommt die „mons Vulkán“ Bezeichnung vielmals vor; gar keine nähere Bezeichnung angedeutet. Vulkan genannte Berge kommen in Ungarn mehrere vor. Weil in der Sammlung Nagy B.-s ausser mit „mons Vulkan“ nur noch mit „Pareng“ bezeichnete Scheden vorkommen und weil Berg Pareng im Comitat Hunyad liegt und ebendort gibt es auch einen Vulkan Berg deswegen ist es wahrscheinlichst das er seine Pflanzen am Hunyader Vulkan Berg gesammelt hat.

Die neuen Daten für unser Vaterland (46) sind mit * Sternchen bezeichnet.

Abkürzung: U. = Pflanzensystematische Institut des budapester Pázmány Péter Universität.

Enumeratio :

Pyrenula nitida (Weig.) Ach.

Com. Esztergom. Pr. pag. Dömös, in valle „Disznós árok“, ad cort. Fagi silvaticae, alt. ca. 500 m. s. m.

Com. Veszprém. Pr. pag. Porva, in cacum. m. „Körös hegyn“, ad cort. Fagi silvaticae, alt. ca. 700 m. s. m.; Pr. opp. Zircz (Putrimajor), ad „Szarvasforrás“, ad cort. Fagi silvaticae, alt. ca. 400 m. s. m.

Sphaerophorus fragilis (L.) Pers.

Com. Szepes. Montes Magastátra, circa lacum „Poprádi tó“, ad saxa granit. (Tomek, in hb. U.).

Com. Fogaras. In alpibus „Nagy Árpás“ (Simonkai, in hb. U.); In saxosis montium „Vertopel“, in alp. Árpásensibus, pr. Kerczisora, alt. ca. 2200 m. s. m. (Tuzson, in hb. U.); In cacum. m. „Netedul“, pr. Kerczisora, in alp. Kercz, alt. ca. 2350 m. s. m. (Tuzson, in hb. U.).

Diploschistes bryophilus (Scop.) Zahlbr.

Com. Zemplén. In oppido Tokaj, sub radic. m. „Tokaji hegyn“, ad terr. inter musc. alt. ca. 120 m. s. m. Thallus K+ lutescens, medulla J+ violaceus.

Gyalecta jenensis (Batsch.) Zahlbr.

Com. Veszprém. Pr. pag. Bákonybél, in decl. m. „Hegyeskő“, ad rup. calc. alt. ca. 300 m. s. m.

Baeomyces roseus Pers.

Com. Pest. Budapest, in „Óbuda“, pr. Téglagyár (Tuzson, in hb. U.).

Com. Baranya. Pr. opp. Pécs, in decl. m. „Misina“, in silva ad terr. alt. ca. 300 m. et 450 m. s. m.

Com. Veszprém. Pr. pag. Porva, ad terr. argill. alt. ca. 400 m. s. m.

Com. Szepes. „Matlárháza“, in alp. Magastátra (Mágocsy, in hb. U.).

Com. Ung. „Hegyfark“ (Dietz, in hb. U.); „Szerednye“ (Mágocsy, in hb. U.).

Com. Bihar. In monte „Toumatyik“, ad Kristyor (Simkovics, in hb. U.).

Com. Arad. „Aranyág“ (Simkovics, in hb. U.).

Baeomyces byssoides (L.) Schaer.

Com. Pest. Budae, ad vias silvarum in monte „Hárs“ (Simkovics, in hb. U.).

Com. Hont. Selmecbánya, „Skleno“ (Dietz, in hb. U.).

Com. Szepes. „Tátra-Széplak“, supra terram (Mágocsy, in hb. U.).

Com. Hunyad? „Theu-Ursului“ (Simkovics, in hb. U.).

Cladonia foliacea var. *convoluta* (Lam.) Vain.

Com. Pest. Pr. p. Csobánka, in cacum. m.

„Oszoly“, ad rup. supra muscos, alt. ca. 310 m. s. m.

Com. Veszprém. Pr. pag. Jutas, sub radic. m. „Grosser Berg“, ad terr. in pascuo, alt. ca. 200 m. s. m. et in decl. m. „Grosser Berg“, ad terr. inter rupes calcareas, alt. ca. 330 m. s. m. fertilis.

Com. Fejér. Pr. pag. Nadap, in cacum. m. „Meleghegy“, ad terr. graniticam alicam (gránitdarán), alt. ca. 350 m. s. m.

— — var. *alcicornis* (Lightf.) Schaer.

Com. Pest. Pr. p. Pilis, ad terr. aren. alt. ca. 100 m. s. m.; Pr. pag. Vasad, in silva „Pótharaszti erdő“, ad terr., solo aremario, alt. ca. 120 m. s. m.; In insula „Csepel“, pr. pag. Csepel, in silva ad terr. aren. alt. ca. 100 m. s. m.

Com. Veszprém. Pr. pag. Jutas, in decl. m. „Grosser Berg“, ad terr. alt. ca. 330 m. s. m. fertilis.

Com. Fejér. Pr. pag. Nadap, in decl. m. „Meleghegy“, ad terr. supra muscos, alt. ca. 330 m. s. m.

Stereocaulon condensatum Hoffm.

Com. Fogaras. In cacum. m. „Netedul“, pr. Kerczisora, alt. ca. 2350 m. s. m. (Tuzson, in hb. U.).

Stereocaulon alpinum Laur.

Com. Szepes. „Magastátra“ (Jermy, in hb. U.).

Com. Beszterce-Naszód. „Borberek“ (Mágocsy, in hb. U.).

Com. Fogaras. In alpe „Nagy Árpás“ (Simonkai, in hb. U.).

Stereocaulon denudatum Flk.

Com. Szepes. Montium Magastátra, circa lacum Poprádi tó, ad terr. (Tomek, in hb. U.).

— — var. *pulvinatum* (Schaer.) Fw.

Com. Szepes. Montium Magastátra, circa lacum „Batizfalvi tó“, ad terr. (Mágocsy, in hb. U.).

Stereocaulon tomentosum (E. Fr.) Th. Fr.

Com. Szepes. „Szepes“ (Dietz, in hb. U.); Montium Magastátra, „Stola“, (sub laco „Csorbai tó“), (Mágocsy, in hb. U.).

Com. Csík. In monte Csomád, supra lacum „Szt.-Anna“ (Simonkai, in hb. U.).

Gyrophora cylindrica (L.) Ach.

Com. Szepes. Montium Magastátra, „Köpataki tó“ (Mágocsy, in hb. U.), et sub „Dürsberg“, ad saxa granit. (Plenzner, in hb. U.); Pr. „Felső Hági“, ad rup. apr. (Tomek, in hb. U.).

Com. Fogaras. In saxosis montium „Vertopel“, in alp. Árpásensibus, pr. Kerczisora, alt. ca. 220 m. s. m. (Tuzson, in hb. U.); In cacum. m. „Netedul“, pr. Kerczisora, in alp. Kercz, alt. ca. 2350 m. s. m. (Tuzson, in hb. U.).

- — *f. *Delisei* (Despr.)
Com. Gömör. „Királyhegy“, ad rup. apr. (*Tomek*, in hb. U.).
Com. Ung. „Szinnai kő“ (*Mágocsy*, in hb. U.).
 — — f. *denudata* Cromb.
Com. Gömör. Sub cacum. m. „Király hegy“, ad saxa gneis. (*Tomek*, in hb. U.).
Com. Fogaras. In saxosis montium „Vertopel“, in alp. Árpásensibus, pr. Kerczisora, alt. ca. 2200 m. s. m. (*Tuzson*, in hb. U.).
 — — f. *fimbriata* Ach.
Com. Szepes. Pr. „Tátralomnitz“, supra saxa calc., alt. ca. 860 m. s. m. (*Tomek*, in hb. U.).
Com. Arad. In alpe „Gejza“ (*Simonkai*, in hb. U.).
Com. Fogaras. In cacumine m. „Netedul“, pr. Kerczisora, in alp. Kercz, alt. ca. 2350 m. s. m. (*Tuzson*, in hb. U.).
 — — var. *tornata* Ach.
Com. Hunyad. „Aragyes“ (*Simonkai*, in hb. U.).

Umbilicaria pustulata (L.) Hoffm.

- Com. Hont.* „Selmečbánya“, ad rup. (*Dietz*. in hb. U.).
Com. Heves. Montium Mátra, pr. p. Mátrafüred, in cacum. m. „Ajnácskő“ hegy, ad rup. andezit, alt. ca. 600 m. s. m.
Com. Gömör. Klenocz, in saxis ad „Oltárkő“ (*Richter*, in hb. U.).
Com. Bars. In monte „Madaras hegy“, pr. Zsarnócza, in saxosis (*Tuzson*, in hb. U.).

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.

- Com. Veszprém.* Pr. p. Porva, in cacum. m. „Körös hegy“, ad cort. Fagi silvaticae, alt. ca. 700 m. s. m.; Pr. pag. Bakonybél, in decl. m. „Felső Hajág“, ad cort. Fagi silvaticae, alt. ca. 500 m. s. m.
Com. Hont. Pr. p. Diósjenő, in decl. m. „N. Hideghegy“, ad cort. Fagi silvaticae, alt. ca. 600 m. s. m.
 — — *var. *leptophylla* (Wallr.) Zahlbr.
Cat. Lich. Univ. III. 1925. p. 316. *Parmelia pulmonaria* β *leptophylla* Wallr. Fl. Crypt. Germ. 1831. p. 507.
Com. Ung. In monte „Polonina Runa“, alt. ca. 1100 m. s. m. (*Szatala* in Bot. Közl. 1916. p. 19 sub *Lob. pulm.*), lobi angusti, ca. 4–5 mm. lat.; In monte „Osny“, pr. pag. Nagyturjaszög, alt. ca. 500 m. s. m. (*Szatala* in Magy. Bot. Lap. 1922. p. 52. sub *Lob. pulm.*), lobi angusti, circ. 5–10 mm. lat.

Lobaria verrucosa (Huds.) Hoffm. — *Lobaria scrobiculata* (Scop.) Gärtner, Meyer et Scherbius.

Com. Bars. „Szklenói völgy“ (*Mágocsy*, in hb. U. sub *Lob. scrob.*).

Com. Modrus. „Mrzla Vodica“, ad cort. Aceris pseudoplatani (*Lengyel*, in hb. U. sub *Lob. scrob.*).

Solorina crocea (L.) Ach.

Com. Fogaras. In saxosis montium „Vertopel“, in alp. Árpásensibus, pr. Kerczisora, alt. ca. 2200 m. s. m. (*Tuzson*, in hb. U.).

in alp. Árpásensibus, pr. Kerczisora, alt. ca. 2200 m. s. m. (*Tuzson*, in hb. U.).

Pertusaria globulifera (Turn.) Nyl.

Com. Zemplén. Pr. opp. Tokaj, sub cacum. m. „Tokaji hegy“, ad cort. Pruni avii, alt. ca. 480 m. s. m.

Lecanora allophana (Ach.) Nyl.

Com. Zemplén. Pr. opp. Tokaj, sub radic., m. „Tokaji hegy“, ad lign. sicc. alt. ca. 130 m. s. m.

Aspicilia calcarea var. *concreta* (Schaer.)

Com. Pest. Pr. Máriaremeté, in decl. m. „Remete hegy“, circa „Kőfülke“, ad rup. calc. alt. ca. 350 m. s. m.

Com. Baranya. Pr. opp. Villány, in jugo m. „Harsány hegy“, ad rup. calc. alt. ca. 220 m. s. m.

Com. Veszprém. Pr. pag. Csesznek, in decl. m. „Cseszneki várhegy“, ad rup. calc. alt. ca. 350 m. s. m.

— — f. *cineraria* (Mass.)

Com. Pest. Budapest, in cacum. m. „Remetehegy“, ad rup. calc. alt. ca. 400 m. s. m.; Pr. pag. Nagykovácsi, in decl. m. „Vörösbér“, ad rup. calc. alt. ca. 400 m. s. m.

Com. Veszprém. Pr. pag. Jutas, sub radic. m. „Grosser Berg“, in pascuo ad rup. calc. alt. ca. 250 m. s. m.

— — f. *nivea* (Flk.)

Com. Veszprém. Pr. pag. Csesznek, in decl. m. „Cseszneki várhegy“, ad rup. calc. alt. ca. 350 m. s. m.

— — f. *ochracea* Koerb.

Com. Baranya. Pr. pag. Villány, sub radic. m. „Harsány hegy“, ad rup. alt. ca. 180 m. s. m.

— — f. *opegraphoides* (DC.)

Com. Pest. Budapest, in jugo m. „Hosszú erdő“, ad rup. calc. alt. ca. 300 m. s. m.

— — f. *viridula* (Flk.)

Com. Pest. Budapest, in jugo m. „Hosszú erdő“, ad rup. calc., alt. ca. 300 m. s. m. Thallus K—. fuscoviridescent, etiam madefacto fuscoviridescent, diseus nudus, margine thalode subcrenulato, sporae bene evolutae non visae.

Com. Veszprém. Pr. pag. Jutas, in decl. m. „Grosser Berg“, ad rup. calc. alt. ca. 330 m. s. m. Sporae in ascis 2, 3, 4, globosae, diametr. ca. 22 μ. Igen kopott példány.

— — f. *atomaria* (Mass.)

Com. Baranya. Pr. opp. Villány, in jugo m. „Harsány hegy“, ad rup. calc. alt. ca. 220 m. s. m.

Aspicilia cinerea var. *vulgaris* (Schaer.)

Com. Pest. Budapest, pone „Farkasréti temető“, (Márton hegy), ad saxa apr. (szarukő breccsián), alt. ca. 300 m. s. m.

Com. Hont. Pr. pag. Kóspallag, in decl. m. „Nagy Inócz“, ad rup. andezit (andezit breccia), alt. ca. 500 m. s. m.

Com. Zemplén. Pr. opp. Tokaj, in cacum. m. „Tokaji hegys“, ad rup. trachyt., alt. ca. 500 m. s. m.

— — var. *alba* (Schaer.)

Com. Fejér. Pr. pag. Sukoro, in monte „Ördög hegys“, ad saxa kvarcítica, alt. ca. 200 m. s. m. Thallus albo — cinereus vel subcinercus, K + post colorem luteum, rubescens, margine sublobate effigurate, medulla J —, disci apotheciorum nudi, sporae non visae.

— — *var. *mastoidea* (Wedd.)

Com. Hont. Pr. pag. Kospallag, in cacum. m. „Nagy Inócz“, ad rup. andezit. alt. ca. 800 m. s. m. Sporae 8-nae, 9—12·5×17—29·5 μ.

— — *var. *papillata* Arn. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien. XXXVII. 1887. p. 93. (sub f.).

Com. Fejér. Pr. pag. Nadap. in decl. m. „Meleg hegys“, ad rup. granit. alt. ca. 300 m. s. m. Thallus sordide cinereo-glauco-viridescens, K + rubescens, areolae in medio elevatis, cum apotheciis (papillaformis), margine thallode integra vel subcrenulata, discus nudus, hymenium J + coeruleus.

Aspicilia contorta (Hoffm.) Krempelh.

Com. Pest. Pr. pag. Budaörs, sub radic. m. „Szekrényes“, alt. ca. 250 m. s. m.

Com. Baranya. Pr. pag. Villány, sub radic. m. „Harsány hegys“, ad rup. calc. alt. ca. 180 m. s. m.

Com. Veszprém. Pr. pag. Herend, in decl. m. „Somod“, ad rup. calc. alt. ca. 300 m. s. m.

— — var. *Hoffmanni* (Ach.)

Com. Veszprém. In opp. Veszprém, in decl. m. „Sz. Benedek hegys“, ad rup. calc. alt. ca. 300 m. s. m.

— — *var. *rupicola* Krempelh. in Lich. Fl. Bayerns. 1859. p. 178.

Com. Pest. Budapest, in jugo m. „Hosszú erdő“, ad rup. calc. alt. ca. 300 m. s. m. Thallus glauco-cinereus, areolis discretis vel subdiscretis, apothecia in centro subelevato vel tandem elevato, disci concavi (raro plani), margine thallode integro tandem crenulato, sporae non evolutae. Telep-mezőcskék meglehetősen összeszorulók, gyakran az aljazatot teljesen takarják, kerekdedek, szélükön néha keskeny felálló poros karimával.

— — var. *albocincta* (Steiner) Gyelnik. n. comb.

Lecanora contorta var. *albocincta* Steiner in Verh. z.-b. Ges. Wien. 1919. p. 88.

Com. Veszprém. In opp. Veszprém, in m. „Sz. Benedek hegys“, ad rup. calc. alt. ca. 300 m. s. m. Sporae non visae.

— — *var. *Budapestinensis* Gyelnik. n. var. *Similis Aspiciliae contortae* (Hoffm.), sed thallus nullus.

Protothallus tenuiter pulverulentus, griseus vel sordide albus, thallus nullus, apothecia sparsa, solitaria vel plures (2—3 [—4]) concres margines apotheciorum crassissimae, albae, disci nigri, pruinosi, plani vel concaviusculi,

epithecum viride vel sordide griseo-viride, hymenium hyalinum, parte superiore viride, hypothecium hyalinum vel fuscum, paraphyses articulatae, sporae in ascis 3—4, bene evolutae non visae, hymenium J + cyaneum.

Com. Pest. Budapest, in jugo m. „Hosszú erdő“, ad rup. calc. canibr. alt. ca. 300 m. s. m.

Faj? Sporát nem mérhettem, azért bár feltűnően különbözik az *Aspicilia contortatöl* mégis mint varietást különböztetem meg. Szembetűnő, hogy a telep hiányzik. Olyan *Lecanora*-nak tűnik első szempillánásra, amelyiknek igen vastag telepi karimája van az apotheciumán. Legközelebb áll a var. *Hoffmanni*-hoz, de az apotheciumot körülvevő kis teleppikkelyek teljesen hiányzanak. Új növényem úgy jellemzhető legjobban, hogy olyan var. *Hoffmanni* ahol az egész telepet csak a vastag telepi karima képviseli.

Art? Sporen konnte ich nicht messen, deswegen, obwohl der Unterschied von *Aspicilia contorta* auffallend ist, habe ich es doch als Varietät unterscheidet. Auffallenderweise fehlt der Thallus. Es sieht in erstem Augenblick wie mit einem dicken Thallusrand versehene *Lecanora* vor. Steht var. *Hoffmanni* nahe aber die Thallusschuppen die die Apothizien umfangen fehlen ganz. Man kann diese neuen Pflanze so am besten charakterisieren; dass es so eine var. *Hoffmanni* sei, wo den ganzen Thallus nur der dicke Thallusrand repräsentiert.

Aspicilia intermutans (Nyl.) Arn. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien. XXXVII. 1887. p. 98.
Lecanora intermutans Nyl. in Flora. 1872. p. 354.

Com. Zemplén. Pr. opp. Tokaj, in cacum. m. „Tokaji hegys“, ad rup. trachyt. alt. ca. 500 m. s. m. Thallus K + rubescens, albidus, medulla J —, disci apotheciorum nudi, sporae ellipsoideae, 25—29·5×17—19 μ, hymenium J + coerulescens.

Aspicilia laevata (Ach.) Arn.

Com. Heves. Montium Mátra, in decl. m. „Mátra bércek“, ad rup. andezit, alt. ca. 550 m. s. m. Sporae 14·5—17×21—28 μ.

Placodium gypsaceum (Sm.) Koerb.

Com. Esztergom. In monte „Dobogókő“, supra saxa calcarea. (Tomek, in hb. U.).

Placodium saxicolum var. *diffractum* (Ach.)

Com. Zemplén. Pr. opp. Tokaj, in cacum. m. „Tokaji hegys“, ad rup. trachyt. alt. ca. 500 m. s. m.

— — var. *versicolor* (Pers.)

Com. Heves. Pr. pag. Nagybátony, in decl. m. „Komos tető“, ad saxa, alt. ca. 300 m. s. m.

Ochrolechia parella *f. *arborea* Lamy.

Com. Baranya. Pr. opp. Pécsvárad, in decl. m.

„Zengő“, ad cort. *Quercus sessiliiflora*, alt. ca. 300 m. s. m.

Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr.

Com. Szepes. „Igló“ (Dietz, in hb. U.); In valle sub lacu „Zöld tó“, alt. ca. 1400 m. s. m. (Tuzson, in hb. U.); Circa lacum „Poprádi tó“, ad lign. putr. (Tomek, in hb. U.)

Com. Hunyad. „Aragyes“ (Simonkai, in hb. U.).

Haematomma coccineum var. *porphyrium* (Hoffm.) Th. Fr.

Com. Pest. Pr. pag. Pillisszentkeresz, ad „Thirring szikla“ (mons Dobogókő), ad rup. trachyt. tofem, alt. ca. 650 m. s. m.

Com. Hont. Pr. pag. Diósjenő, in decl. m. Csóványos (ad „Oltárkő“), ad saxa andezitica, alt. ca. 900 m. s. m.

Haematomma ventosum (L.) Mass. *Lichen cruentus* Web. Spic. Fl. Goett. 1778. p. 184. *Lecanora ventosa* β *lepadolemma* Ach. Univ. 1810. p. 399. Exs. Rabh. Lich. europ. 197 (in hb. U.), Thallus aurantiacus. Schultz. Herb. norm. 678 (in hb. U.), thallus virido-luteus.

Com. Gömör. „Királyhegy“, ad saxa gneiss. (Tomek, in hb. U.), thallus viridulus, sterilis.

Com. Ung. „Beszkidek“ (Dietz, in hb. U.), thallus viridulus.

Com. Fogaras. In cacum. m. „Netedul“, pr. Kerczisora, in alp. Kerz, alt. ca. 2350 m. s. m. (Tuzson, in hb. U.), thallus luteo-viridulus.

— — *var. *lecidina* (Schaer.) Gyelnik. n. comb.

Lecanora ventosa b. *lecidina* Schaer. Enum. 1850. p. 84. Exs. Leight. Lich. Brit. 9. (in hb. U.), thallus viridulus.

Apothecium jól észlel- Apothecien mit deut- heitő magasszegéllyel. lichem Eigenrand.

Com. Szepes. Montium Tátra, „Csorbaer Thal“ (Hazsl. in hb. U.)

Com. Mármáros. In alpe „Petrosa“ (Hazsl. Bot. Zeitg. [1868] p. 135, in hb. U.), thallus pallide rufescens vel viridulo-rufescens.

Com. Fogaras. In saxosis montium „Vertopel“, in alp. Árpásensibus, pr. Kerczisora, alt. ca. 2200 m. s. m. (Tuzson, in hb. U.), thallus viridulus.

Com. Hunyad. „Aragyes“ (Simonkai, in hb. U.), thallus viridulo-rubescente-luteus.

Candelaria concolor (Dicks.) Vain.

Com. Zemplén. Pr. opp. Tokaj, sub radic. m. „Tokaji hegys“, ad lign. siccum, alt. ca. 130 m. s. m.

Parmeliopsis aleurites (Ach.) Nyl.

Com. Baranya. Pr. opp. Pécsvárad, in. decl. m. „Zengő“, ad lign. sicc. putr. alt. ca. 300 m. s. m.

Com. Zemplén. In pags „Agárd“, ad saeptum putridum, alt. ca. 100 m. s. m.

Parmeliopsis ambigua (Wulf.) Nyl.

Com. Pest. Budapest, in decl. m. „Vadaskert“, ad lign. sicc. alt. ca. 300 m. s. m.

Com. Baranya. Pr. opp. Pécsvárad, in decl. m. „Zengő“, ad lign. putr. alt. ca. 300 m. s. m.

Com. Veszprém. Pr. pag. Bakonybél, in jugo m. „Parajos hegys“, ad lign. putr. alt. ca. 500 m. s. m.

Com. Hont. Pr. pag. Kóspallag, in decl. m. „Vörösbérc“, ad lign. sicc. alt. ca. 350 m. s. m.

Parmelia acetabulum (Neck.) Duby.

Com. Pest. Pr. pag. Csév, in jugo m. „Pilis hegys“, ad cort. Aceris campestris, alt. ca. 600 m. s. m.; Inter pagos Monor et Pilis, in silva „Monori erdő“, ad cort. Robiniae pseud-acaciae, alt. ca. 110 m. s. m.; Pr. pag. Vasad, in silva „Pótharaszti erdő“, ad cort. Populi nigrae, alt. ca. 120 m. s. m.

Com. Esztergom. Pr. pag. Csév, in decl. m. „Pilis hegys“, ad cort. Pruni alt. ca. 500 m. s. m.

Com. Heves. Montium Mátra, sub cacum in „Nagy Galya“, ad cort. Betulae verrucosae, alt. ca. 900 m. s. m.

Parmelia aspidota (Ach.) Röhl.

Com. Gömör. Pr. Rimaszombat, in silv. „Szabadka“ (Richter, in hb. U.).

Parmelia caperata (L.) Ach.

Com. Bács-Bodrog. Pr. Alsó-kovély, in silva, ad cort. *Quercus* (Zorkacz, in hb. U.).

Com. Baranya. Pr. pag. Villány, in jugo m. „Harsány hegys“, ad cort. *Tiliae*, alt. ca. 220 m. s. m.

Com. Heves. In cort. *Fagi silvaticae*, in silvis pr. „Istenmezeje“ (Tuzson, in hb. U.).

Com. Gömör. „Pokorágyi sziklák“ (Richter, in hb. U.).

Com. Szepes. Magas Tátra, „Felkai völgy“, (Sadler, in hb. U.).

Com. Arad. In montibus ad Aranyág et Pankota (Simonkai, in hb. U.).

Com. Alsó-Fehér. „Gyulaféhérvár“ (Rapaics, in hb. U.).

Com. Krassó-Szörény. „Kernyécsa“ (Beluleszkó, in hb. U.).

Slavonia. „Morovicz“, ad cort. *Querc. pedunc.* (Tuzson, in hb. U.).

— — *f. *muscicola* Harm.

Com. Pest. „Budaörs“, supra muscos (Endrey, in hb. U.); Budapest, „Jánoshegy“, ad cort. supra muscos (Schilberszky, in hb. U.).

Com. Baranya. Pr. opp. Pécs, in cacum. m. „Misina“, ad cort. *Quercus lanuginosae*, alt. ca. 530 m. s. m.; Pr. opp. Pécsvárad, in decl. m. „Zengő“, ad cort. *Quercus sessiliiflora*, alt. ca. 300 m. s. m.

Com. Veszprém. Pr. opp. Zircz, in valle „Czuha völgy“, ad rup. calc. alt. ca. 400 m. s. m.

Com. Bars. Pr. Zsarnóczia, in monte „Madaras hegy“ (*Tuzson*, in hb. U.).

— — *f. *laevissima* *Gyelnik.* n. f.

Similis f. muscicola *Harm.*, sed *thallus saperne omnino et constanter laevissimus. Soredia, papillae et isidia desunt. Thallus plus minusve rugosus.*

Ezt a formát a *Parmelia caperata* minden egyéb áltakjától megkülönbözteti a teljesen soredium és papilla vagy isidium mentes telep, karélyok szélükön csipkék, telep felülről ránkos.

Com. Fejér. Pr. pag. Nadap, in cacum. m. „Meleg hegy“, ad rup. appliticam umbrosam, inter muscos, alt. ca. 350. m. s. m.

— — *f. *sorediosa* *Malbr.*

Com. Pest. Inter pagos Monor et Pilis, in silva „Monori erdő“, ad cort. *Robiniae pseudacaciae*, alt. ca. 110 m. s. m.

Com. Fejér. Ad pag. Sukoro, ad cort. *Pruni domesticae*, alt. ca. 130 m. s. m.

Com. Heves. Montium Mátra, in decl. m. „Mátrabérc“, in Querceto, ad cort. *Quercus cerris*, alt. ca. 550 m. s. m.

Com. Zemplén. Pr. opp. Tokaj, sub cacum. m. „Tokaji hegy“, ad cort. *Pruni avii*, alt. ca. 480 m. s. m.

Com. Sáros. „Eperjes“ (*Jermy*, in hb. U.).

Com. Ung. „Ungvár“, ad *Gymnospermam (Tabody)*, in hb. U.).

Com. Mármaros. „Mármaros (Suliguli)“ (*Tabody*, in hb. U.).

Com. Alsó-Fehér. Ad cort. *Quercus pedunculatae*, in silvis „Koris erdő“, pr. Szászcsanád (*Tuzson*, in hb. U.).

Com. Krassó-Szörény. „Lugos“, ad *Robiniam pseudacaciæ* (*Földváry*, in hb. U.).

Slavonia. „Morovič“, in cort. *Quercus pedunculatae* (*Tuzson*, in hb. U.).

— — *f. *papillosa* *Harm.*

Com. Pest. Budapest, „Hárshegy“ (*György*, in hb. U.).

Com. Veszprém. Pr. pag. Porva, ad cort. *Pini silvestris*, alt. ca. 400 m. s. m.

Com. Sáros. „Sóvár“ (*Frank*, in hb. U.).

Com. Arad. In monte „Hegyes“ (*Simonkai*, in hb. U.).

— — *f. *saxicola* *Müll. Arg.*

Com. Pest. Budapest, in monte „Hárshegy“, supra saxa et muscos (*Lengyel*, in hb. U.).

— — f. *subglauca* *Nyl.*

Com. Pest. Pr. pag. Vasad, prope „Pótharaszti erdő“, ad cort. *Juniperi communis*, alt. ca. 120 m. s. m.

Com. Somogy. Ad trunco Quercuum in silvis montis „Kishegy“ pr. Balatonlelle, (*Sántha*, in hb. U. sub *P. caperata*).

Com. Krassó-Szörény. „Herkulesfürdő“, ad cort. (*Szabó Z.*, in hb. U.).

Parmelia cetrariooides Del.

Com. Heves. Montium Mátra, sub cacum. m. „Kékes“, in Fageto, ad cort. *Fagi silvaticae*, supra muscos, alt. ca. 1000 m. s. m.

Parmelia Délisei Nyl.

Com. Pest. Budapest, „Mátyáshegy“ (*Tomek*, in hb. U.) et „Felső kecskehegy“ (*Schilberszky*, in hb. U.).

Com. Heves. Montium Mátra, mons „Mátrabérc“, ad rup. andezit. alt. ca. 750 m. s. m.

Néztem szerint *Parm. prolixa* név alatt még sok adat kerül elő majd a herbariamokból.

Parmelia fuliginosa (E. Fr.) Nyl.

Coin. Heves. Montium Mátra, pr. „Szoros patak bányásztelep“, sub radic. m. „Mátrabérc“, ad cort. *Quercus cerris*, alt. ca. 350 m. s. m.

Parmelia glabra (Schaer) Nyl.

Com. Pest. Budapest, in jugo montis „Ördög- orom“, ad cort. *Pruni Mahaleb*, alt. ca. 300 m. s. m.; „Gugerhegy“, ad cort. *Quercus (Tomek*, in hb. U.); „Hűvösvölgy“, „Határút“ (*Tomek*, in hb. U.); „Kamara erdő“, ad cort. *Ulmi (Tomek*, in hb. U.); *Pr. Makkos Mária*, ad cort. *Quercus lamiginosi*; „Fóth“, ad cort. (*Schilberszky*, in hb. U.); Pécel, „Lőtér“, ad cort. *Robiniae pseudacaciae (Tomek*, in hb. U.).

Com. Baranya. Pr. opp. Pécs, in cacum. m. „Mišina“, ad cort. *Corni maris* et *Fraxini ornis*, alt. ca. 500 m. s. m.; Pr. opp. Pécsvárad, in cacum. m. „Zengő“, ad cort. *Piri pirastris*, alt. ca. 680 m. s. m.

Com. Somogy. Pr. p. „Balatonboglár“, ad cort. (*Tetéljeni P.*).

Com. Heves. Montium Mátra, in decl. m. „Kékes“, in Querceto, ad cort. *Quercus sessiliflorae*, alt. ca. 800 m. s. m.

Com. Gömör? In arce Murány, supra corticem *Aceris pseudoplatani* (*Tomek*, in hb. U.).

Com. Arad? Ad fontes vallis „Kladova“ (*Simonkai*, in hb. U.).

Parmelia glabratula Lamy.

Com. Baranya. Pr. opp. Pécsvárad, in cacum. m. „Zengő“, ad cort. *Carpini betuli*, alt. ca. 680 m. s. m.

Com. Veszprém. Pr. p. Porva, in cacum. m. „Körös hegy“, ad cort. *Fagi silvaticae*, alt. ca. 700 m. s. m.; Pr. pag. Bakonybél, in decl. m. „Közép Hajág“, ad cort. *Fagi silvaticae*, alt. ca. 400 m. s. m.; Pr. pag. Lókút, ad cort. *Fagi silvaticae*, alt. ca. 500 m. s. m.; Pr. pag. Doba, in decl. m. „Somló“, ad rup. basált. alt. ca. 400 m. s. m.

Com. Hont. Pr. pag. Kismaros, in valle „Csömöle völgy“, ad rup. siliceum, alt. ca. 150 m. s. m.; Pr. pag. Diósjenő, in cacum. m. „Csóvá-

nyos", ad cort. Fagi silvaticae, alt. ca. 930 m. s. m.
Parmelia glomellifera Nyl. — *Parm. glomellifera f. anerythrophora* Harm. L. de Fr. 1909. p. 539.
Com. Pest. Pr. pag. Pomáz, sub radic. m. „Csikóvár“, ad rup. trachyt. alt. ca. 400 m. s. m.; Pr. pag. Szentendre, sub radic. m. „Kőhegy“, ad rup. trachyt. alt. ca. 250 m. s. m.
Com. Hont. Pr. pag. Kóspallag, in decl. m. „Vörösbérc“, ad rup. siliceum (andezit breccia), alt. ca. 400 m. s. m.
Com. Heves. Montium Mátra, in m. „Mátrabérc“, ad rup. andezit. alt. ca. 750 m. s. m. et sub cacum. m. „Nagy Galya“, ad rup. andezit. alt. ca. 900 m. s. m.
Com. Gömör. „Tót-Pokorág“ (Richter, in hb. U.).
A herbariumokból *Parmelia isidiotyla* név alatt még több is előkerül majd.

Parmelia incolorata (Parr.) Lettau.

Com. Pest. Pr. pag. Izbég, sub radic. m. „Kőhegy“, ad cort. Fagi silvaticae, alt. ca. 250 m. s. m.
Com. Veszprém. Pr. pag. Porva, sub radic. m. „Körös hegy“, ad cort. Fagi silvaticae, alt. ca. 500 m. s. m.
Com. Zemplén. Pr. opp. Tokaj, sub cacum. m. „Tokai hegy“, ad cort. Pruni avii, alt. ca. 480 m. s. m.

Parmelia olivacea (L.) Ach.

Com. Baranya. Pr. pag. Villány, in decl. m. „Harsány hegy“, ad cort. Ulmi scabrae, alt. ca. 220 m. s. m.
Com. Veszprém. Pr. pag. Porva, in cacum. m. „Körös hegy“, ad cort. Fraxini excelsioris, alt. ca. 700 m. s. m.

Parmelia perlata (L.) Ach.

Com. Fejér. Pr. pag. Nadap, in decl. m. „Meleg hegy“, ad cort. Quercus, alt. ca. 310 m. s. m.

Parmelia pertusa (Schrank.) Schaer.

Com. Mármaros. Mármarossziget, „Körös mező“ (Szénert, in hb. U.).
Com. Arad. Sub monte „Hegyes“, versus pagum Solymos (Simonkai, in hb. U.).

Parmelia physodes (L.) Ach.

Com. Pest. Pr. pag. Pomáz, mons „Oszoly“, ad rup. aren., inter muscos, alt. ca. 250—300 m. s. m.; „Fóth“, ad ramulum Pini (Schilberszky, in hb. U.); Pr. pag. Vasad, in silva „Pótharaszti erdő“, ad cort. Juniperi communis, alt. ca. 120 m. s. m.; Inter pagos Monor et Pilis, in silva „Monori erdő“, ad cort. Robiniae pseudacaciae, alt. ca. 110 m. s. m.

Com. Veszprém. Pr. pag. Csékút, in m. „Szöllő hegy“, ad rup. basalt. alt. ca. 300 m. s. m.
Com. Fejér. Pr. pag. Nadap, in cacum. m.

„Meleg hegy“, ad rup. applitcam umbrosam, alt. ca. 350 m. s. m.
Com. Heves. Montium Mátra, sub cacum. m. „Nagy Galya“, ad cort. Betulae verrucosae, alt. ca. 900 m. s. m.
Com. Zemplén. Pr. opp. Tokaj, in cacum. m. „Tokaji hegy“, ad rupem, alt. ca. 500 m. s. m. Thallus esorediosus.
Com. Sáros. „Eperjes“ (Frank, in hb. U.).
Com. Arad. In montibus ad „Aranyág“ (Simonkai, in hb. U.).
— — var. *vulgaris* (Koerb.)
Com. Pest. Budapest, in valle „Farkasvölgy“ (Szabó Z., in hb. U.).
Com. Heves. In cort. Fagi silvaticae, in silvis prope Isten mezeje (Tuzson, in hb. U.).
Com. Gömör. „Vereskő“, ad Gymnospermam (Tomek, in hb. U.).
Com. Szepes. Lőcse, „Kereszthegy“ (1096 m.), supra cort. Laricis (Szurák, in hb. U.).
Com. Ung. „Bajánháza“ (Tabody, in hb. U.).
Com. Krassó-Szörény. „Herkulesfürdő“ (Szabó Z., in hb. U.).
— — var. *labrosa* Ach.
Com. Zemplén. Pr. opp. Tokaj, in cacum. m. „Tokaji hegy“, ad rup. trachyt. alt. ca. 500 m. s. m.
— — f. *platyphylla* Ach.
Com. Pest. Budapest, „Gugerhegy“, ad cort. Quercus (Tomek, in hb. U.); Pr. pag. Margitliget, mons „Oszoly“, ad rup. aren. alt. ca. 250—300 m. s. m.
Com. Hont. Pr. pag. Kóspallag, in jugo m. „Vörösbérc“, ad rup. andezit. alt. ca. 400 m. s. m.
Com. Heves. Montium Mátra, sub cacum. m. „Nagy Galya“, ad cort. Betulae verrucosae, alt. ca. 900 m. s. m.
— — *f. *maculans* Oliv.
Com. Pest. Pr. Budapest, „Kamaraerdő“, ad cort. Quercus (Lengyel, in hb. U.).
Com. Heves. Montiam Mátra, sub cacum. m. „Nagy Galya“, ad cort. Betulae verrucosae, alt. ca. 900 m. s. m. et in decl. m. „Galya vár“, ad rup. andezit. alt. ca. 750 m. s. m.
— — f. *granulata* Boist.
Com. Pest. Budapest, in decl. m. „Vadaskert“, ad rup. aren. alt. ca. 300 m. s. m.; Pr. pag. Pomáz, in decl. m. „Csikóvár“, ad cort. Fraxini, alt. ca. 250 m. s. m.
Com. Veszprém. Pr. pag. Csékút, in m. „Szöllő hegy“, ad rup. basalt, alt. ca. 300 m. s. m.
— — *var. *glaucoides* Gyelnik. n. var.
Thallus glaucus, vel *viridulo-glaucus*. In ceteris ut in var. *vulgaris*.
Com. Veszprém. Pr. pagum Porva, ad corticem *Pini silvestris*, alt. ca. 400 m. s. m.; Prope pagum Lókút, in silva, ad corticem *Laricis deciduae*, alt. ca. 450 m. s. m.
Com. Nógrád. Prope pagum Diósjenő, in decl. m. „Csóványos“, ad corticem *Pini nigrae*, alt. ca. 600 m. s. m.

Eddigi megfigyelésem szerint ez az új varietás kizárolag Magyarország dombvidékeinek *Pinus* vagy *Larix* törzsein fordul elő és azt hiszem minden ezen a két fenyőfélén élő *Parmelia physodes* egyúttal a var. *glaucoides* is. Feltűnő a fák törzsén már messzirol kékes színű telepével. Analog a *Parmelia caparata* f. *subglaucoides* Nyl.-el. Havasi fenyőkről származó *Parmelia physodes*-eket nem vizsgáltam, lehet, hogy ott is ezen a kétféle fenyőn élők szintén ilyen kékes színeik.

Thallus plus minusve contiguus, vel nonnunquam plus minusve imbricatus, ad apices loborum plerumque labrosaeforme sorediosus.

Parmelia crinita Ach.

Com. Krassó-Szörény. „Cserna völgy” (Lengyel, in hb. U. sub *P. pilosella*).

Parmelia Pokornyi (Koerb.) Zahlbr.

Com. Pest. Pr. pag. Káposztásmegyer, ad terr. aren. apricam, alt. ca. 130 m. s. m.; in arenosis pr. Dabas (Tuzson, in. hb. U.); Monor (Mágócsy, in. hb. U.)

Com. Fejér. Pr. pag. Sukoró, indecl. m. „Meleg hegy”, ad terram graniticam alicam (gránit darán), alt. ca. 300 m. s. m. *Accedens ad P. prolixa, quasi hybrida inter P. Pokornyi et P. prolixa sed pro maxima parte P. Pokornyi est.*

Parmelia prolixa (Ach.) Nyl.

Com. Pest. Budapest, „Felső Kecske hegy”, ad rupem calciream* (Schilberszky, in. hb. U.) — — *f. perrugata* (Nyl.) Hue.

Com. Zemplén. Pr. opp. Tokaj, in cacum. m. Tokaji hegy”, ed rup. trachyt. alt. ca. 500 m. s. m.

— — var. *panniformis* (Nyl.) Harm.

Com. Zemplén. Pr. opp. Tokaj, in cacum. m. „Tokaji hegy”, ad rup. trachyt. alt. ca. 500 m. s. m.

**Parmelia rosaformis* (Ach.) Gyelnik n. comb. *Parmelia saxatilis* var. *rosaformis* Ach. Univ. 1810 p. 470; Th. Fr. Seand. 1871—74. p. 115; *Parmelia sulcata* Taylor In Mackay

*Nem ellenőrizhettem, mert a herbárium Példányon az aljazatból nem volt semmi.

Nach meinen bisherigen Beobachtungen kommt diese neue Varietät ausschliesslich an *Pinus* oder *Larices* in dem Hügelland Ungarns vor, und ich bin überzeugt, dass alle auf den zwei Gymnospermen lebende *Parmelia physodes* zugleich auch die var. *glaucoides* sind. Mit ihrem bläulichem Thallus schon von weitem auffallend. Analoge Form mit *Parmelia caparata* f. *subglaucoides* Nyl. Solche *Parmelia physodes* die von alpinischen Gymnospermen stammten, sah ich nicht, dass auch in der Alpenregion die von den erwähnten zwei Gymnospermen stammenden auch eine bläuliche Farbe zeigen.

Fl. hibern. 1836. p. 145; *Parmelia saxatilis* β *sulcata* Nyl. Syn. I. 2. 1859. p. 389; Th. Fr. I. c. p. 114.

Th. Fr. (I. c.) megvizsgálta Acharius eredeti var. *rosaformis*-át és azt részben *Parmelia sulcata*, részben pedig *Cetraria glauca*-nak találta. Néztem szerint e két növény közül kizárolag a *Parmelia*-t nem pedig a *Cetrariá*-t, illette a var. *rosaformis* név, mert Acharius ismerte a *Cetrariá*-kat és nem valószínű, hogy ezt a két növényt egynek nézte volna. Vagy pedig, ha a *Cetrariá*-t illette volna ez a név, akkor nem a *Parmeliá*-k közé tette volna. Mivel pedig a var. *rosaformis* régebbi név mint a *P. sulcata*, tehát a *P. sulcata* helyes régebbi neve a *Parmelia rosaformis* (Ach.) Gyelnik lesz.

Th. Fr. (I. c.) untersuchte das Acharius'sche Original var. *rosaformis*, und er konstatierte, dass es einerseits *Parmelia sulcata* anderseits *Cetraria glauca* ist. Nach meiner Ansicht kommt der Name var. *rosaformis* von den zwei Flechten nur *Parmelia* und nicht *Cetraria* zu, denn Acharius kannte die *Cetrarien* und es ist nicht wahrscheinlich, dass er diese zwei Pflanzen als eine Pflanze angesehen hätte, oder wenn dieser Name der *Cetraria* zu stehen möchte, hätte er es nicht zwischen die *Parmelien* eingeteilt. Weil der Name var. *rosaformis* gegen der *P. sulcata* eine Priorität hat ist die richtige Name des *P. sulcata* *Parmelia rosaformis* (Ach.) Gyelnik.

Com. Pest. Budapest, „Sashegy” (Szabó Z., in hb. U.); Pr. Budapest, „Kamara erdő”, ad cort. *Aceris platanoidis* (Tomek in hb. U.) et ad lign. putr. (Lengyel, in hb. U.); Budapest, „Vérhalom” ad cort. *Pruni Amygdali* (Tomek, in hb. U.); inter pagos Monor et Pilis, in silva „Monori erdő”, ad cort. *Robiniae pseudacaciae* et *Quercus Roburis*, alt. ca. 110 m. s. m.

Com. Csongrád. „Hódmezővásárhely”, supra terram (Endrey, in. hb. U.);

Com. Baranya. Pr. pag: Villány, in jugo m. „Harsány hegy”, ad. cort. *Tiliae*, alt. ca 220 m. s. m.; pr. opp. Pécs, in cacum. m. „Misina” ad cort. *Fraxini orni* alt. ca. 530 m. s. m.; pr. opp. Pécsvárad, in cacum m. „Zengő”, ad cort. *Carpini betuli* et *Quercus sessiliflorae*, alt. ca. 680 m. s. m.

Com. Veszprém. Pr. pag. Óporva, in cacum. m. „Kőrös hegy”, ad cort. *Fagi silvaticae*, alt. ca. 700 m. s. m.; pr. pag. Csékut, in m. „Szőlő hegy”, ad. rup. basalt. supra muscos, alt. ca. 300 m. s. m.

Com. Heves. Montium Mátra, sub. cacum m. „Nagy Gálya”, ad cort. *Betulae verrucosae*, alt. ca. 900 m. s. m. et in decl. m. „Gálya vár”, ad cort. *Fagi silvaticae*, alt. ca. 750 m. s. m.

Com. Borsod. In truncis putrescentibus *Fagi silvaticae*, ad pag. Hollóskút, pr. Lillafüred (Kiss, in hb. U.)

Com. Gömör. „Rimaszombat” (Richter, in hb. U.)

Com. Szepes. Lőcse, „Kereszt hegy“ (Szurák, in hb. U.)

Com. Zemplén. Pr. opp. Tokaj, in cacum. m. „Tokaji hegy“, ad rup. trachyt. alt. ca. 500 m. s. m. et sub. cacum. m. „Tokaji hegy“, ad cort. Pruni avii alt. ca. 480 m. s. m.

Com. Ung. „Bajánháza“ (Tabody, in hb. U.)

Com. Arad. Montes Kodru, in saxosis calcareis, montis „Arsure“, alt. ca. 930 m. s. m. (Simonkai, in hb. U.)

Com. Fogaras. In alpe „Nagy Arpás (= Vurtop)“ (Simonkai, in hb. U.)

— — *f. *rubescens* (Roumeg.) Gyelnik. n. comb. — *Parmelia sulcata* f. *rubescens* Roumeg Lich. gall. exs. no. 247.

Com. Baranya. Pr. opp. Pécsvárad, in cacum. m. „Zengő“, ad cort. Quercus sessiliflorae, alt. ca. 680 m. s. m.

Com. Veszprém. Pr. pag. Porva, in cacum. m. „Körös hegy“, ad cort. Mali silvestris, alt. ca. 700 m. s. m.

Com. Heves. Montium Mátra, in decl. m. „Mátra bércek“, in Querceto, ad cort. Quercus cerris, alt. ca. 550 m. s. m.

Com. Krassó-Szörény. „Szárkó“, ad lign. putrid. (Lengyel, in hb. U.)

— — var. **laeviuscula* (Malbr.) Gyelnik. n. comb. — *Parmelia sulcata* var. *laeviuscula* Malbr. Catal. Lich. Norm. p. 107.

Com. Pest. „Buda“ (Sándor, in hb. U.)

Com. Bars. In cortice Fagi ad „Jávoros“ pr. Bükköskut (Tuzson, in hb. U.)

Parmelia saxatilis (L.) Ach.

Com. Hont. Selmecbánya, in. m. „Tanád hegy“. (Mágócsy, in hb. U.)

Com. Szepes. Pr. „Tátralomnitz“, supra terram, alt. ca. 800 m. s. m. (Tomek, in hb. U.)

Com. Arad. Montes Kodru, in saxosis cilcareis montis „Arsure“, alt. ca. 930 m. s. m. (Simonkai, in hb. U.)

Com. Fogaras. In cacumine montis „Netedul“, pr. Kerczisora, in alp. Kerz, alt. ca. 2350 m. s. m. (Tuzson, in hb. U.); in saxosis montium „Vertopel“, in alp. Arpásensibus, pr. Kerczisora, alt. ca. 2200 m. s. m. (Tuzson, in hb. U.)

— — f. *furfuracea* Schaer.

Com. Bars. In saxis rhioliticis pr. „Vihnye“. (Tuzson, in hb. U.)

Com. Gömör. Alp. „Kakas“, pr. Nagyrőcze. (Richter, in hb. U.)

Com. Szepes. „Tátralomnitz“. (Tomek, in hb. U.)

Com. Fogaras. In saxosis montium „Vertopel“, in alp. Ánpásensibus, pr. Kerczisora, alt. ca. 2200 m. s. m. (Tuzson, in hb. U.)

— — *f. *caesia* Nyl.

Com. Pest. Budapest, in decl. m. „Vadaskert“, ad terr. supra muscos, alt. ca. 300 m. s. m.

Parmelic scoreta Ach.

Com. Pest. „Dobogókő“ (Lengyel, in hb. U.); pr. pag. Pomáz, mons „Köhegy“, ad rup. andezit. alt. ca. 360 m. s. m.

Com. Baranya. Pr. pag. Villány, in jugo m. „Harsányhegy“, ad cort. Tiliae, alt. ca. 220 m. s. m.

Com. Veszprém. Pr. pag. Porva, sub radic. m. „Köröshegy“, ad cort. Fagi silvestris, alt. ca. 500 m. s. m.; pr. pag. Csékut, in monte „Szöllőhegy“, ad rup. basalt. alt. ca. 300 m. s. m.

Com. Heves. Montium Mátra, in decl. m. „Gálya vár“, ad cort. Fagi silvaticae alt. ca. 750 m. s. m. et pr. pag. Mátrafüred, in cacum. m. „Ajnácskő“, ad rup. andezit. alt. ca. 600 m. s. m.

Com. Zemplén. Pr. opp. Tokaj, in cacum. m. „Tokaji hegy“, ad rup. trachyt. alt. ca. 500 m. s. m.

— — *f. *coeruleascens* Harm.

Com. Hont. Pr. pag. Diósjenő, in decl. m. „Nagy Hideghegy“, ad cort. Fagi silvaticae, alt. ca. 600 m. s. m.

Com. Heves. Montium Mátra, in decl. m. „Gálya vár“, ad cort. Fagi silvaticae, alt. ca 750 m. s. m.

— — *f. *pruinosa* Harm.

Com. Esztergom. Pr. pag. Csév, in decl. m. „Pilis (Csévi szirtek)“ adc ort. Quercus lanuginosae, alt. ca. 550 m. s. m.

Com. Ung. „Vinnai várhegy“ (Dietz, in hb. U.)

— — var. **sublaevigata* Nyl.

Com. Baranya. Pr. opp. Pécsvárad, in cacum. m. „Zengő“, ad cort. Carpinii betuli alt. ca 680 m. s. m.

Com. Veszprém. Pr. pag. Porva, in cacum. m. „Köröshegy“, ad cort Fraxini excelsioris alt. ca. 700 m. s. m.

Com. Heves. Montium Mátra, in decl. m. „Gályavár“, ad rup. andezit. inter muscos, alt. ca. 750 m. s. m.

Parmelia sorediata (Ach.) Th. Fr.

Com. Bars. In saxis rhioliticis pr. „Vihnye“ (Tuzson, in hb. U.)

Com. Heves. Montium Matra, in decl. m. „Mátra bércek“, in querceto, ad rup. andezit. alt ca. 550 m. s. m.; pr. pag. Mátrafüred, in cacum. m. „Ajnácskő“, ad. rup. andezit. alt. ca 600 m. s. m.

Parmelia subaurifera Nyl.

Com. Pest. Budapest, pr. m. „Gyulavár“, ad lign. putr.; inter pagos Monor et Pilis, in silva „Monori erdő“, ad cort. Robiniae pseudacaciae, alt. ca. 110 m. s. m.

Com. Baranya. Pr. opp. Pécs, in cacum. m. „Misina“, ed cort. Fraxini orni, alt. ca. 530 m. s. m.

Com. Hont. Pr. pag. Kismaros, in valle „Csömölé völgy“, ad cort. Carpinii betuli, alt. ca. 150 m. s. m.

Com. Szepes. „Lucsivna“, ad cort. Populi tremulae (Plenzner, in. hb. U.); Tátralomnitz, pr. vallem „Nagytarpatkai völgy“ (Tomek, in hb. U.)

Com. Alsó-Fehér. Ad cort. *Quercus pedunculatae*, in silvis „Koris erdő“, pr. Szászcsanád. (Tuzson, in hb. U.)

Parmelia tiliacea (Hoffm.) Ach.

Com. Pest. Budapest „Gugerhegy“, ad cort. *Quercus* (Tomek, in hb. U.), „Kamaraerdő“, ad cort. *Ulmus* (Tomek, in hb. U.); „Péczel“, Lötér, supra corticem *Gleditschiae* (Tomek, in hb. U.)

— — *f. munda* (Schaer.)

Com. Pest. Budapest, pr. Makkos Mária sub. radic. m. „Meredek csucs“, ad lign. putr. in silva, alt. ca. 350 m. s. m. in cacum. m. „Remete hegy“, ad cort. *Quercus*, alt. ca. 400 m. s. m.; inter pagos Monor et Pilis in silva „Monori erdő“, ad cort. *Robiniae pseudacaciae*, alt. ca. 110 m. s. m.

Com. Baranya. Pr. pag. Villány, in jugo m. „Harsány hegy“, ad cort. *Tiliae*, alt. ca. 220 m. s. m.

Com. Veszprém. „Bakony“, supra corticem *Betulae* (?), in hb. U.)

Parmelia trichotera Hue.

Com. Esztergom. In monte „Dobogókő“. (Tomek, in hb. U.)

— — **f. munda* Harm.

Com. Esztergom. In monte „Dobogókő“, supra ramos (Tomek, in hb. U.)

Parmelia tubulosa (Schaer.) Bitt.

Com. Fejér. Pr. pag. Nadap, in cacum. m. „Meleg hegy“, ad rup. appliticum, alt. ca. 350 m. s. m.

Com. Heves. Montium Mátra, sub cacum. m. „Nagy Gálya“, ad cort. *Betulae verrucosae*, alt. ca. 900 m. s. m.

— — **f. cornuta* Harm.

Com. Pest. Budapest, in decl. m. „Vadaskert“, ad rup. aren. alt. ca. 300 m. s. m.

Com. Arad. Montes Kodru, montis „Arsurae“, alt. ca. 930 m. s. m. (Simonkai, in hb. U.)

— — **f. verruciformis* Harm.

Com. Pest. Budapest, in declivibus montis „Vadaskert“, ad rupem arenariam.

— — **f. rugososorediosa* Gyelnik, n. f.

Lobi thalli cylindrici, adscendentes, non modo ad apices sorediosi, sed etiam plus minusve in omnine thallo sorediosi, thallus vehementer rugosus. A planta typica differt thallus vehementer rugosus, et non modo ad apices loborum sed etiam plus minusve in omnine thallo sorediosus. Planta seniora?

Com. Zemplén. In oppido „Tokaj“, sub radicibus montis „Tokaji hegy“, ad rupem trachyticam, alt. ca. 120 m. s. m.

Telep tubulozus. a hengerded telep karabélyok felállók, végükön tányér-szerűen kiszélesedők, szoredíumosak, azonkvül a telep jórészt a henger-

ded karélyok oldalán is szemcséssenzoredíumos. Szoredíumok zöldék, vagy piszkos zöldesszürkék. Telep felül szürke, erősen ráncos, kopasz. Telep alul fekete, széle-felé világosabb. A *P. tubulosa*-tól oldalán is szoredíumos telep karélyával erős ráncosságával különbözik.

teils auch an der Seite der cylindrischen Lobi körnig sorediös. Soredien sind grün oder schmutzig grünlich grau. Thallus auf der Oberseite grau, stark runzelig, kahl, auf der Unterseite schwarz, gegeht den Rand heller. Von *P. tubulosa* ist es durch die auch an der Seite sorediösen Lobi und durch die stark runzelige Thallusoberseite unterscheidet.

Parmelia verruculifera Nyl.

Com. Pest. Inter pagos Monor et Pilis, in silva „Monori erdő“, ad cort. *Quercus Roburis*, alt. ca. 110 m. s. m.

Com. Baranya. Pr. pag. Villány, in jugo m. „Harsány hegy“, ad cort. *Tiliae*, alt. ca. 220 m. s. m.

Com. Hont. Pr. pag. Kismaros, in valle „Csömöle völgy“, ad cort. *Carpini betuli*, alt. ca. 150 m. s. m.

Com. Heves. Pr. Pag. Üveghuta, in fageto, ad cort. *Fagi silvaticae*, alt. ca. 700 m. s. m.

Com. Gömör. In silvis „Tót-Hegymeg“, ad cort. *Fagi silvaticae* (Richter, in hb. U.); in silvis „Tót-Pokorágy“, ad cort. *Fagi silvaticae* (Richter, in hb. U.)

Com. Zemplén. Pr. opp. Tokaj, sub radic. m. „Tokaji hegy“, ad lign. siccum, alt. ca. 130 m. s. m.

Cetraria cucullata (Bell.) Ach.

Com. Brassó. Sub. alpe „Köhavas“. iuxta Brassó (Simonkai, in hb. U.)

Com. Fogaras. In cacumine montis „Netedul“, pr. Kerczisora, in alp. Kerz, alt. ca. 2350 m. s. m. (Tuzson, in hb. U.)

Cetraria glauca (L.) Ach.

Com. Beszterce-Naszód. „Ünökő“ (Mágócsy, in hb. U.)

Com. Fogaras. In saxosis montium „Vertopel“, in alp. Árpásensibus, pr. Kerczisora, alt. ca. 2200 m. s. m. (Tuzson, in hb. U.)

Centraria islandica (L.) Ach.

Com. Vas. Inter muscos, in m. Borostyánkő, ad „Kienhegy“, (Waisbecker, in hb. U.)

Cetraria juniperina (L.) Ach.

Com. Brassó. In alpe „Csukás“ (Simonkai, in hb. U.)

Cetraria nivalis (L.) Ach.

Com. Hunyad. In cacumine supra m. „Pareng“ (Nagy B., in hb. U.)

Thallus tubulös, die cylindrischen Lobi des Thallus sind aufgerichtet, an der Spitze tellerartig erweitert, sorediös, außerdem ist der Thallus grössten-

Cetraria pinastri (Scop.) E. Fr.

Com. Pest. Pr. pag. Pilisszentkereszt, in cacum m. „Dobogókő“, ad corticem *Quercus cerris*, alt. ca. 700 m. s. m.

Com. Hont. Pr. pag. Kóspallag, in decl. m. „Vörös bérce“, ad lign. putr. alt. ca. 350 m. s. m.

Com. Heves. Montium Mátra, sub cacum. m. „Nagy Gálya“, ad cort. *Betulae verrucosae*, alt. ca. 900 m. s. m. et in decl. m. „Mátrabérc“, in querceto, ad cort. *Quercus cerris*, alt. ca. 450 m. s. m.

Com. Szepes. „Tátraszéplak“ (Mágócsy, in hb. U.)

Evernia prunastri f. *sorediifera* Ach.

Com. Pest. Pr. pag. Vasad, in silva „Pótharaszti erdő“, ad cort. *Populi nigri* et *Juniperi communis*, in collibus, alt. ca. 120 m. s. m.

Com. Baranya. Pr. pag. Villány, in decl. m. „Harsányhegy“, ad cort. *Ulmus scabrae*, alt. ca. 220 m. s. m.; pr. opp. Pécs, in cacum. m. „Misina“, ad cort. *Fraxini ornatae*, alt. ca. 520 m. s. m.

Com. Veszprém. Pr. pag. Csesznek, in valle „Czuhá völgy“, ad cort. *Aceris campestris*, alt. ca. 400 m. s. m.; pr. pag. Jutas, ad cort. *Quercus lanuginosae*, alt. ca. 250 m. s. m.

Com. Heves. In cort. Fagi silvaticae, pr. „Isten mezeje“ (Tuzson, in hb. U.); montium Mátra, in decl. m. „Mátra bérce“, in querceto, ad cort. *Quercus cerris*, alt. ca. 450 m. s. m.

Com. Alsó-Fehér. Ad cort. *Quercus pedunculatae*, in silvis „Koris erdő“, pr. Szászcsanád (Tuzson, in hb. U.)

Alectoria implexa (Hoffm.) Ach.

Com. Szepes. Lőcse, „Kereszthegy“, ad cort. Laricis deciduae, alt. ca. 1095 m. s. m. (Szurák, in hb. U.)

— — var. *cana* (Ach.) Nyl.

Com. Gömör. In monte subalpina „Kakas“ (Richter, in hb. U.)

Com. Csik. In arboribus prati „Kukojzsás“ (Simonkai, in hb. U.)

Com. Hunyad. Mons „Vulkán“ (Nagy B., in hb. U.)

— — f. *fuscidula* Arn.

Com. Szepes. In silva circa lacum „Csorbai tó“, ad ramulum *Gymnospermae* (Tomek, in hb. U.)

— — *f. *rufula* Gyelnik n. f.

Similis Alectoriae implexae var. *canae* (Ach.) Nyl., sed rami thalli parce rufuli, thallus $K+$ lutescens.

Com. Szepes. Pr. „Tátralomnitz“, ad ramulos *Gymnospermae*. (Tomek, in hb. U.)

Alectoria jubata var. *prolixa* Ach.

Com. Pest. Inter pagos Monor et Pilis, in silva „Monori erdő“, ad cort. *Robiniae pseudacaciae*, alt. ca. 110 m. s. m.

Com. Heves. Montium Mátra, in decl. m. „Mátra bércek“, in querceto, ad cort. *Quercus cerris*, alt. ca. 550 m. s. m.

Com. Brassó. „Schuler“ ad Brassó (Römer, in hb. U.)

— — var. *capillaris* Ach.

Com. Szepes. Magas Tátra, in cacum. m. „Stösschen“ (Mágócsy, in hb. U.) et Tátralomnitz, prope vallem „Nagytarpataki völgy“ (Tomek, in hb. U.) et circa lacum „Csorbai tó“ ad ramulos *Gymnospermae* (Tomek, in hb. U.) et pr. Felső-Hági, iuxta „Klotild-út“, ad ramulos *Gymnospermae* (Tomek, in hb. U.)

Com. Arad. In silvis ad Nádas et Kresztaméres, „Aranyág“ (Simonkai, in hb. U.)

— — *f. *sorediata* Harm.

Com. Szepes. Pr. „Felső-Hági“, ad ramulos *Gymnospermae* (Tomek, in hb. U.)

Com. Arad. In silvis ad Nádas et Kresztaméres, „Aranyág“ (Simonkai, in hb. U.)

Com. Krassó-Szörény. „Szászkabánya“, ad lign. (fakeresztről) (Odor B., in hb. U.)

— — var. *subcana* (Nyl.) DT. et S.

Com. Hunyad. Mons „Vulkán“ (Nagy B., in hb. U.)

Alectoria ochroleuca (Ehrh.) Nyl.

Com. Gömör. Prope cacum. m. „Királyhegy“ (Tomek, in hb. U.)

Com. Szepes. Prope lacum Batizfalva (Mágócsy-Dietz, in hb. U.); „Felkai völgy“ (Sadler, in hb. U.)

Com. Beszterce-Naszód. „Borberek“ (Mágócsy, in hb. U.)

Com. Fogaras. In cacumine montis „Netedul“, pr. Kerczisora, in alp. Kerz, alt. ca. 2350 m. s. m. (Tuzson, in hb. U.)

Com. Hunyad. „Pareng“ (Nagy B., in hb. U.)

Alectoria rubens (Kernst.) Gyelnik n. comb.

Alectoria cana f. *rubens* Kernstock Lich.

Beitz. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien. 1892.

p. 341.

— — var. **typica* Gyelnik. n. var.

Thallus elongatus, ad apicem versus *capillaris*, *pallidus* (*albidus*, *albido-cinerascens* vel *cinerascens*), *esorediosus*, *K+ lutescens* tandem *rubescens*.

Com. Gömör. Prope „Vereskő“, ad cort. *Gymnospermae* (Tomek, in hb. U. exempl. orig.).

Com. Hunyad. Mons „Vulkán“ (Nagy B., in hb. U.)

— — *f. *subfuscata* Gyelnik n. f.

Thallus fuscus vel *fuscidulus*. In ceteris ut in var. *typica* Gyel.

Com. Szepes. Ad ramulum Laricis europaeorum, in silva „Grosser Wald“, montium Magas Tátra, alt. ca. 915 m. s. m. (Szatala, in Magy. Bot. Lap. XXIV. 1925. p. 68. sub *Alect. implexa* f. *fuscidula*. Exempl. orig. in hb. Szatala in Budapest.)

— — *f. *ignea* Gyelnik n. f.

Thallus rubescens. In ceteris ut in var. *typica* Gyel.

Com. Gömör. „Királyhegy“ (Entz, in hb. U. exempl. orig.)

— — var. **sorediosula* Gyelnik n. var.

Thallus elongatus, ad versus apices ramulum *capillares*, *pallidus* (*albidus*, *cinerascens* vel

plerumque albido-cinerascens), e soredia maculiformia, rotundata, elevata, alba ornata, Thallus K+ lutescens tandem rubescens. Exs. Krypt. exs. 1048 (in hb. U. exempl. orig.)

Com. Szepes. Circa lacum „Csorbai tó“, ad ramulos Gymnospermae. (Tomek, in hb. U.).

*— — f. *fusca Gyelnik n. f.*

Thallus fuscus. In ceteris ut in var. sorediosula Gyel.

Com. Szepes. Circa lacum „Csorbai tó“, ad ramum Gymnospermae. (Tomek, in hb. U. exempl. orig.).

Letharia divaricata (L.) Hue.

Com. Pest. Pr. pag. Vasad, in silva „Pótharaszti erdő“, ad cort. Populi nigrae, alt. ca. 120 m. s. m.

Com. Heves. Montium Mátra, sub cacum. m. „Nagy Galya“, ad cort. Betulae verrucosae, alt. ca. 900 m. s. m.

Ramalina calicaris (L.) E. Fr.

Com. Pest. Pr. pag. Vasad, in silva „Pótharaszti erdő“, ad cort. Populi nigrae, alt. ca. 120 m. s. m.

Ramalina farinacea (L.) Ach.

Com. Pest. Pr. pag. Vasad, in silva „Pótharaszti erdő“, in populeto, ad cort. Populi nigrae, alt. ca. 120 m. s. m.

Com. Baranya. Pr. opp. Pécs, in decl. m. „Zengő“, ad cort. Quercus sessiliflorae, alt. ca. 300 m. s. m.

Com. Heves. Montium Mátra, sub cacum. m. „Nagy Galya“, ad cort. Betulae verrucosae, alt. ca. 900 m. s. m.

Com. Hunyad. Pr. cacum. „Dragouc“, montis Vulkán (Nagy B., in hb. U.).

Ramalina fraxinea (L.) Ach.

Com. Pest. Pr. pag. Vasad, in silva „Pótharaszti erdő“, ad cort. Populi nigrae, alt. ca. 120 m. s. m.

Com. Baranya. Pr. opp. Pécs, in cacum. m. „Misina“, ad cort. Fraxini orni, alt. ca. 520 m. s. m.; pr. opp. Pécsvárad, in cacum. m. „Zengő“, ad cort. Fraxini, alt. ca. 680 m. s. m. et ad cort. Quercus sessiliflorae, alt. ca. 300 m. s. m.

Com. Heves. Montium Mátra, sub cacum. m. „Nagy Galya“, ad cort. Betulae verrucosae, alt. ca. 900 m. s. m.

*— — *f. taeniata Ach.*

Com. Pest. Pr. pag. Vasad, in silva „Pótharaszti erdő“, ad cort. Populi nigrae, alt. ca. 120 m. s. m.

Com. Veszprém. Pr. pag. Jutas, ad cort. Quercus lanuginosae, alt. ca. 250 m. s. m.

— — f. ampliata Ach.

Com. Pest. Pr. pag. Vasad, in silva „Pótharaszti erdő“, ad cort. Populi nigrae, alt. ca. 120 m. s. m.

Com. Veszprém. Pr. pag. Csékút, in monte

„Szöllő hegy“, ad cort. Betulae, alt. ca. 300 m. s. m.

— — f. luxurians Del.

Com. Pest. Pr. pag. Vasad, in silva „Pótharaszti erdő“, in populeto, ad cort. Populi nigrae, alt. ca. 120 m. s. m.

Com. Heves. Montium Mátra, in decl. m. „Gályavár“, ad cort. Fagi silvaticae, alt. ca. 750 m. s. m.

Ramalina pollinaria (Westr.) Ach.

Com. Bars. „Vihnye“ (Tuzson, in hb. U.).

Com. Borsód. In saxo calcareo in monte „Fehérkőlápa“, Lillafüred, pr. Miskolc. (Kiss, in hb. U.).

Com. Krassó-Szörény. Herkulesfürdő, „Kocsihu Hurku“, ad cort. (Szabó Z., in hb. U.).

— — f. humilis Ach.

Com. Veszprém. Pr. pag. Csékút, in monte „Szöllő hegy“, ad rup. basalt. alt. ca. 300 m. s. m.; pr. pag. Doba, in decl. m. „Somló“, ad rup. basalt. alt. ca. 400 m. s. m.

Com. Fejér. Pr. pag. Nadap. in cacum. m. „Meleg hegy“, ad rup. appliticam umbrosam, alt. ca. 350 m. s. m.

Com. Hont. Pr. pag. Kóspallag, in cacum. m. „Nagy Inócz“, ad rup. andezit. (andezit breccsia), alt. ca. 800 m. s. m.

Com. Heves. Montium Mátra, pr. pag. Mátrafüred, in cacum. m. „Ajnácskő“ ad rup. andezit. alt. ca. 600 m. s. m.

Ramalina populina (Ehrh.) Vain.

Com. Heves. Montium Mátra, in decl. m. „Kékes“, pr. Utakaparoház, ad cort. Quercus sessiliflorae, alt. ca. 700 m. s. m.

Ramalina strepsilis (Ach.) Zahlbr.

Com. Pest. Pr. pag. Budaörs, in valle „Kiesvölgy“, alt. ca. 320 m. s. m.

Com. Zemplén. Pr. opp. Tokaj, in cacum. m. „Tokaji hegy“ ad rup. alt. ca. 500 m. s. m.

Usnea ceratina Ach.

Com. Bihar? In alpibus Bihar, in procul cacumine „Tynók“ (Simonkai, in hb. U.).

*— — *f. scabrosa Ach.*

Com. Szepes. „Matlárháza“, in alp. Magas Tátra (Mágócsy, in hb. U.).

Com. Hunyad. Mons „Vulkán“ (Nagy B., in hb. U.).

*— — *f. scaberrima Harm.*

Com. Hunyad. Mons „Vulkán“ (Nagy B., in hb. U.).

*— — *f. villosa (Ach.) Harm.*

Com. Arad. Aranyág, „Pankota“ (Simonkai, in hb. U.).

*— — *f. denudata Bory.*

Com. Heves. Montium Mátra, sub cacum. m. „Nagy Galya“, ad cort. Betulae verrucosae, alt. ca. 900 m. s. m. et in decl. m. „Mátrabércek“,

in querceto, ad cort. *Quercus cerris*, alt. ca. 550 m. s. m.

Usnea dasypoga (Ach.) Nyl.

Com. Szepes. Circa lacum „Csorbai tó“, ad ramulos Gymnospermae. (*Tomek*, in hb. U.)

Com. Arad. In silvis ad Nádas et „Kresztáméres“ (*Simonkai*, in hb. U.)

Com. Hunyad. Mons „Vulkán“ (Nagy B. in hb. U.)

— — *var. plicata* (L.) Hue.

Com. Gömör. Nagy Rócz, monte „Kakas“, ad cort. *Piceae excelsae* (*Richter*, in hb. U.)

Com. Szepes. Magas Tátra Circa „Késmárki itató“, ad ramulos Gymnospermae (*Tomek*, in hb. U.) et circa lacum „Csorbai tó“, ad ramulos Gymnospermae (*Tomek*, in hb. U.)

Com. Hunyad. Mons „Vulkán“, (Nagy B. in hb. U.)

Usnea florida (L.) Hoffm.

Com. Hont. Selmecbánya, „Szitnya“ (Mágócsy, in hb. U.)

Com. Bars. „Szklenoi völgy“ (Mágócsy, in hb. U.)

Com. Szepes. Lőcse „Kereszthegy“, alt. ca. 1096 m. s. m. ad cort. *Laricis europaea* (*Szurák*, in hb. U.); „Viborna“ (*Richter*, in hb. U.); „Tátralomnitz“, ad cort. *Laricis deciduae* (Mágócsi, in hb. U.); Magas Tátra, „Turistaút“, ad ramulos Gymnospermae (*Plenzner*, in hb. U.) et prope „Vaskapu“. (*Tomek*, in hb. U.)

Com. Brassó. In valle „Tömösi szoros“, supra cort. *Abietis* (*Endrey*, in hb. U.)

— — **f. papulata* Harm.

Com. Szepes. „Tátralomnitz“, in alp. Magas Tátra (*Tomek*, in hb. U.)

Com. Arad. In montibus ad „Kladova“ (*Simonkai*, in hb. U.)

— — **f. strigosa* Ach.

Com. Szepes. In valle dicta „Virág völgy“, supra ramulos *Abietis* (Lányi, in hb. U.)

Com. Arad. „Punkoj“ ad Menyháza (*Simkovics*, in hb. U.)

Usnea hirta (L.) Hoffm.

Com. Pest. „Budapest“ (*Sándor*, in hb. U.)

Com. Heves. Montium Mátra sub cacum. m., „Nagy Gálya“, ad cort. *Betulæ verrucosæ*, alt. ca. 900 m. s. m. et in decl. m., „Mátra-bércek“, in querceto, ad cort. *Quercus cerris*, alt. ca. 550 m. s. m.

Com. Gömör. „Rimaszombat“ (*Richter*, in hb. U.); „Királyhegy“, ad *Pinum* (*Entz*, in hb. U.)

Com. Szepes. Lőcse, „Kereszthegy“, ad ramulos *Laricis europaea*, alt. ca. 1096 m. s. m. (*Szurák*, in hb. U. *cum fruct.*); Tátralomnitz, prope vallem „Nagytarpataki völgy“ (*Tomek*, in hb. U.)

Com. Hajdu. Debrecen „Nagyerdő“ (Gerenday, in hb. U.).

Com. Arad. Montes „Kodru“, in saxosis calcariis, alt. ca. 930 m. s. m. (*Simonkai*, in hb. U.), *pl. calcicola*.

Com. Csík. Pr. balneum „Tusnádfürdő“ (*Rapaics*, in hb. U.)

Com. Krassó-Szörény. „Szászkabánya“ (*Odor B.*, in hb. U.)

Slavonia. „Morovic“, in cort. *Quercus pedunculatae* (*Tuzson*, in hb. U.)

Usnea longissima Ach.

Com. Brassó. In valle „Tömösi szoros“ (*Endrey*, in hb. U.)

Com. Hunyad. „Uj Gredistye“ in fago (*Jávorka*, in hb. U.)

Thamnolia vermicularis (Su.) Ach. — *Cladonia vermicularis* α *simplex* DC. ap. Lam. et DC. Fl. Fr. ed. 3. vol. II. 1805. p. 335.

Com. Gömör. In cacum. m. „Királyhegy“, ad terram (*Tomek*, in hb. U.) et inter muscos (*Györfy*, in hb. U.)

Com. Szepes. Magas Tátra, in vallem „Felkai völgy“ (*Sadler*, in hb. U.) et circa lacum „Batizfalvi tó“, ad terram (*Mágócsy*, in hb. U.)

Com. Mármaros. In alpibus ad Rodna, in monte „Bukujescu“, supra terram, alt. ca. 2122 m. s. m. (*Kurimay*, in hb. U.) ad f. tauricam vergens.

Com. Beszterce-Naszód. „Únökő“ (*Mágócsy*, in hb. U.), ad f. tauricam vergens, thallus roseoalbidus.

Com. Fogaras. In alpe „Nagy Árpás“ (*Simonkai*, in hb. U.); in saxosis montium „Vertopel“, in alp. Árpásensisbus, pr. Kerczisora, alt. ca. 2200 m. s. m. (*Tuzson*, in hb. U.)

— — *var. tauria* Wolf. — *Cladonia verm. β subramosa* DC. ap. Lam. et DC. Fl. Fr. ed. 3 vol. II. 1805. p. 335.

Com. Hunyad. „Pareng“ (Nagy B. in hb. U.)

Xanthoria Candelaria (L. em. Ach.) Arn.

Com. Zemplén. Pr. pag. „Agárd“, ad cort. *Quercus Roburis* alt. ca. 100 m. s. m. (sub *X. lichenoides*)

Buellia epipolia (Ach.) Oliv.

Com. Veszprém. Pr. pag. Csesznek, in decl. m. „Cseszneki várhegy“, ad rup. calc. alt. ca. 350 m. s. m.

— — *var. pancinum* (Mass.)

Com. Veszprém. Pr. pag. Csesznek, in decl. m. „Várhegy“, ad rup. calc. alt. ca. 350 m. s. m. Thallus K + pallidissime roseolus, hypothecium rubescens-brunneolum, hymenium J + cyaneum, sporae in asci 8-nae, brunneolae, 2-3 tandem 4 cellulares, 6-8.5×12-17 μ.

Buellia venusta (Kbr.)

Com. Pest. Budapest, in jugo m. „Hosszú erdő“, ad rup. calc. alt. ca. 300 m. s. m.

Com. Esztergom. Pr. pag. Csév, in decl. m. „Pilis (Csévi szirtek)“, ad rup. calc. alt. ca. 550 m. s. m. Thallus K—, J—, hypothecium rubescens-brunneolum, sporae 6-8.5×12.5 μ.

Com. Baranya. Pr. opp. Villány, in jugo m. „Harsányhegy“, ad rup. calc. alt. ca. 220 m. s. m.

Com. Veszprém. Pr. opp. Zircz, in valle „Czuha-völgy“, ad rup. calc. alt. ca. 400 m. s. m.

— — *f. *Jutasi Gyelnik n. j.*

A planta typica differt thallo pallide ochraceo-vel ochraceo vel cinereo-ochraceo.

Com. Veszprém. Pr. pag. Jutas, sub pede montis „Grosser Berg“, in pascuo ad rupem calcaream, alt. ca. 300 m. s. m.

Sporák 4·5-8·5×12·5-16 μ, 2-3-4 sejtűek, 8 az ascusban, egyenesek, vagy kissé hajlottak, eliptikusak, sötétbarnák, vagy veresbarnák, a keresztfalaknál gyakran befúzódők, hypothecium sötét vörösbarna, hymenium hyalin vagy világos veres-barna, J+kék, epithecium feketésbarna, discus kopasz, vagy igen ritkán kissé deres, domború, gonidiumok zöld-dek, 10-16 μ nagyok, telep K-, J-.

Phycia aipolia *f. *cremulata* Vain. Adjum. I. 1881. p. 136.

Com. Zemplén. Pr. pag. Agárd, ad cort. Quercus Roburis, alt. ca. 100 m. s. m. Apothecia nigra, glabra, concava, margine apotheciorum crenulata, thallus et medulla K+ lutercens.

— — f. *cercidia* (Ach.) Vain.

Com. Zemplén. Pr. pag. „Agárd“, ad cort. Quercus Roburis, alt. ca. 100 m. s. m.

Phycia ascendens Bitt.

Com. Zemplén. Pr. pag. „Agárd“, ad cort. Quercus Roburis, alt. ca. 100 m. s. m.

Phycia pulverulenta f. *argyphae* (Ach.) Nyl.

Com. Zemplén. Pr. pag. „Agárd“, ad cort. Populi albae, alt. ca. 100 m. s. m.

— — f. *turgida* (Schaer.) Harm.

Com. Zemplén. Pr. opp. Tokaj, sub radicibus m.

„Tokaji hegy“, ad lign. siccum. alt. ca. 130 m. s. m.

Phycia virella var. *Georgiensis* (Zahlbr.) Mer.

Com. Zemplén. In pago „Agárd“, ad lignum siccum alt. ca. 100 m. s. m.

Anaptychia ciliaris var. *vulgaris* Koerb. Par. 1865 p. 19. (sub a).

Com. Pest. Inter pagos Monor et Pilis, in silva „Monori erdő“, ad cort. Quercus Roburis, alt. ca. 110 m. s. m.

Com. Baranya. Pr. opp. Pécsvárad, in cacum. m. „Zengő“, ad cort. Ulmi scabrae, alt. ca. 680 m. s. m.

Com. Heves. Montium Mátra, sub cacum. m. „Nagy Gálya“, ad cort. Betulae verrucosae, alt. ca. 900 m. s. m.

— — *f *platyphylla* Wallr. Fl. Cr. Germ. III. 1831. p. 484. (sub a).

Com. Pest. Pr. pag. Vasad, in silva „Pótharaszti erdő“, ad. cort. Populi nigrae, alt. ca. 120 m. s. m. Thallus cinereus, tomentosus, laciniae tandem 3%- latae.

— — *f *actinota* (Ach.)

Com. Baranya. Pr. opp. Pécs, in cacum. m. „Misinia“. ad cort. Quercus lanuginosae, alt. ca. 520 m. s. m.

Com. Veszprém. Pr. pag. Porva, in cacum. m. „Kőröshegy“, ad cort. Fraxini excelsioris, alt. ca. 700 m. s. m.

Com. Heves. Montium Mátra, sub cacum. m. „Nagy Gálya“, ad cort. Betulae verrucosae, alt. ca. 900 m. s. m.

— — f. *agriopa* (Ach.)

Com. Heves. Montium Mátra, in decl. m. „Mátra bércek“, in querceto, ad cort. Quercus cerris, alt. ca. 550 m. s. m.

— — var. *verrucosa* (Ach.)

Com. Zemplén. In oppido Tokaj, sub radic. m. „Tokaji hegy“, ad rup. trachyt. alt. ca. 120 m. s. m.

— — var. *saxicola* (Nyl.) Jatta.

Com. Veszprém. Pr. pag. Bakonybél, in jugo m. Parajos hegy“, ad rup. calc. umbrosam, alt. ca. 650 m. s. m.

(Separatum editum 1928. 15. IV.)

