

Rosa Györfifyana n. sp. et species diversae generis Rosae a Prof^e Györffy in montibus Bakonyensibus collectae.

Auctore Dre A. de DEGEN (Budapest).

E sectione *Caninae* DC. ser. *Collinae* Crépin. Primit. I. 1869: 41; Désegl. Catal. rais. 1877: 212. Frutex humilis, valde ramosus, ramis ramulisque brevibus, dense foliosis, pricibus cortice viridibrunnea obtectis, crebre aculeatis, *aculeis rectis*, 5—7 mm. longis, conicis, vix arcuatis, horizontaliter patentibus, basi parum dilatatis, (in ramulis novellis etiam aculei magis curvati, basin versus magis dilatati inveniuntur); ramulis florigeris brevibus, foliis congestis obtectis; *stipulis* supra glabris, subtus tenuiter tomentellis et glandulis conspernis, margine dense ciliatis et glandulosis, parte libera breviter ovato-triangulari; *petiolis* tomentosis, dorso aculeis minutis, fere rectis, stramineis armatis simulque glandulis stipitatis rubellis sparse obsitis, *foliis* mediocribus, 4—6 cm. longis, glaucis, foliolis septenis, approximatis, margine, sese tegentibus, imis minoribus, mediis c. 2 cm. longis, 1 cm. latis, ovato lanceolatis, brevissime acuminatis, simpliciter dentatis, dentibus nonnullis denticulo stipitato-glanduloso auctis, supra dense pilosis, subtus tomentosis et ad nervum medianum glandulis rubellis, stipitatis obsitis, nervis secundariis arcuatis crebris, prominentibus, foliolo terminali longius petiolulato, majore; *bracteis* dilatatis, ovatis, acuminatis, supra glabris, ad nervum medium pilosiusculis, subtus tomentellis, margine sparse glandulosis; pedunculis solitariis vel 1—3-nis, brevibus (c. 1 cm.), dense setis glanduliferis obsitis, caeterum glabris; *receptaculis* parvis, ovatis, pruinosis, aequaliter setis glanduliferis dense obsitis; *sepalis* supra et margine lanuginosis, subtus dense pilosis glandulisque stipitatis et sessilibus rubellis conspersis, margine glandulosis, exterioribus laciniatis, lacinulis utrinque 2, lanceolatis inciso-dentatis, et stipitato-glandulosis, lacinula terminali elongata et parum dilatata; *floribus* parvis (c. 3 cm. diam.), pallide roseis; *stylis* pilosis.

Habitat in Hungariae mediae montibus Bakonyensibus, ubi prope Borzavár alt. 400 m. mense Majo 1920 detexit Prof.

Dr. Stefanus Győrffy, cui species nova in tesseram amititiae dicata.

Proxima *R. sarmatica* H. Braun in Spraw. Kom. Fizyogr. Akad. Krakow. XXI. 1886 : 39, (*R. Déseglisei* Bor. var. *sarmatica* Hayek, Flora Stir. I. 1908—11: 931)¹⁾, differt 1. *aculeis rectis*, 2. foliolis minoribus, 3. serratura foliorum minus profunda, dentibus nounullis glandula auctis, 4. petalis minoribus, 5. *receptaculis tota superficie setis glanduliferis obtectis*.

A *R. Déseglisei* Bor. Fl. du Centre, ed. 3. II. 1857 : 224 differt 1. pedunculis non velutinis, sed glabris, densius setulosis; 2. *aculeis rectis*, horizontaliter patentibus; 3. foliolis multo minoribus, densius vestitis; 4. foliis subtus ad nervum medianum glandulosis; 5. stipulis supra glabris; 6. petiolis aculeolatis et glandulosis; 7. sepalis dorso glandulosis; 8. floribus fere duplo minoribus; 9. *receptaculis setoso-glandulosis*; 10. stylis non elongatis.

A *R. hispidula* Rip. ap *Désegl.* S. B. Belg. XV. 1876 : 386 differt 1. stipulis subtus tomentellis; 2. foliolis supra dense pilosis; subtus tota superficie tomentellis; 3. sepalis dorso glandulosis; 4. *receptaculis setoso-glandulosis*; a *R. Boreykiana* Bess. Catal. sem. h. Crem. 1820; Enum. 61 (cfr. Crépin B. S. Belg. XVIII. 1879 : 254) differt 1. foliolis parvis, septenis, basi non cordatis; 2. ramis abbreviatis; 3. *aculeis rectis*, homomorphis; 4. petalis pallide roseis multo minoribus; 5. *receptaculis setoso-glandulosis*; a *R. Vukotinovicii* Borb. ap. Vuk., Rad Jugosl. Akad. LXIX. 1884 : 23 differt 1. *aculeis tenuibus rectis*; 2. foliolis parvis, serratura aliena, basi non rotundatis; 3. densius vestitis; 4. *floribus minoribus*; 5. pedunculis non aciculatis et setoso-glandulosis, sed tantum setoso-glandulosis; 6. *receptaculis tota superficie glanduloso-setosis*. *Rosa dumetorum* v. *Pesiana* Burn. et Greml., Ros. d. Alp. marit. Suppl. 1882—3 : 39 procul distat petalis albis, foliorum forma et indumento, aequaliter var. *pseudo-collina* Christ, Rosen d. Schweiz, 1873 : 188, *aculeorum et foliorum forma, stylis lanuginosis, receptaculis globosis, glabris etc.*

1. *Rosa canina* L. v. *transitoria* R. Kell. Bakonybél vidéke.

Kisalmapuszta majorról a Porva felé menet, a Kékhegy lejtőjén 440 m. (1920. V. 25). — Herend és Bakonybél között (Dr. Schermann 1923. VII. 22).

¹⁾ *Rosa Deseglisei* Bor. (*R. dumetorum* A. II. *Déseglisei* R. Kell. ap. Aschers. et Graebn. Syn. VI. 1. 1901 : 179) sec. descriptionem et sec. exempl. a cl. Dre Gillot in Gallia lectis a *R. sarmatica* valde differt pedunculis pilosis, foliolis majoribus, eorumque forma et indumento, floribus majoribus etc.

2. *Rosa Desvauxi H. Br.* (*Rosa glaucescens Desv. non al.*) Kis-almapusztamajorról Porva felé menet 440. v. 25. Porvai határ, Borzavár felé menet 440. v. 25. Bakonybél-től a Körös-hegyre menet a Parajos oldalán 440. v. 24. Borzavár m. 430 m. v. 25. (stylis pilosis elongatis).
3. *R. flexibilis Dés.* Borzavár és Zirc közt a Bocskor-hegyen (Dr. Scherm. 1923. VII. 23.)
4. *Rosa eriostyla Rip.* Porvai határ, Borzavár felé menet 440 m. v. 25. Borzavár és Zirc közt a Bocskor-hegyen 440 m. v. 25.
5. *R. globularis Franck?* Borzavár és Zirc közt a Bocskor-hegyen 440 m. v. 25.
6. *R. dumalis Bechst. v. rubelliflora* Dés. Zirc m. Pénzeskut-major fölött a Köveshegyen 500. (v. 23.)
R. dumalis Bechst. A Bocskor-hegyen Borzavár és Zirc közt (Dr. Schermann 1923. VII. 23). — Herend és Bakonybél közti úton (Dr. Sch.)
 f. o. ad var. *leucam* Wiesb. accedens (ramulis inermibus) Borzavár és Zirc közt a Bocskor-hegyen 440 m. (v. 25).
7. *Rosa dumalis Bechst. v. oreades Cott. et Cast.* (stylis parce pilosis) Zirc m. a Tündér-major felé menet 420 m. (v. 23.).
8. *Rosa calophylla Christ.* Herend és Bakonybél közti úton (Dr. Scherm. 1923. VII. 22.).
9. *Rosa podolica Tratt.* Bakonybél, Kisalmapusztamajor és Porva közt a Kékhegy alatt 440 m. v. 25. — Zirc vidéke Pénzes pusztá felé menet a Köveshegy előtt 500 m. (v. 23.). (ad eriostylam Rip. vergens, petiolis puberulis) — Zirc-Bakonybél, Somhegytől k.-re fekvő gerincen (v. 23.). (ad eriostylam verg.) — Zirc-Tündér-major-Köveshegy közt 480 m. v. 23. (ad eriost. vergens.) — Bakonybél, vidéke Kisalmapusztamajor-Porva közt 440 m. v. 25 — Bakonybélről Körös-hegyre menet a Parajos oldalon 440 m. (v. 24.). (Dr. Sch. is)
 fo. n. *bakonyensis Deg.* (stipulis poroso stipitato glandulosis) Bakonybél vidéke. Kisalmapusztamajor, Porva közt a Kékhegy alján 440 m. v. 25. — Zirc és Bakonybél közt a Somhegytől k.-re fekvő gerincen 480 m. (v. 23.) — Zirc m. a Bocskor-hegy tövében 400 m (v. 25.).
10. *Rosa biserrata Merat.* Bakonybél vidéke, Kisalmapusztamajorról a Porva felé menet a Kékhegy lejtőjén, 440 m. (v. 25.). — (A. R. podolica felé hajló alak, alul deres levelekkel.) Porvai határ, Borzavár felé, a Kékhegy alján (v. 25.). Bakonybélből

- a Köröshegyre menet a Parajos oldalán 440 m. (v. 24). — Zircz vidéke a Bencéskut felett a Köveshegyen 500 m. (v. 23).
11. *Rosa transsilvanica* Schur. Borzavár m. 440 m. v. 25. — Zircz vidéke. Tündérmajor—Köveshegy közti, 480 m. v. 23. — Zircz m. Tündérmajor felé menet 420 m. v. 23. — Zircz és Bakonybél közti a Somhegytől keletre fekvő gerincen 480 m. v. 23. — Zirczről Bakonybélre menet. Pénzeskutpuszta felett a Somhegy áltól 480 m. v. 23. — Zircz, Tündérmajor és Pénzeskutpuszta közti a Somhegyre menet 480 m. v. 23. — Bakonybélről Köröshegyre menet a Parajos oldalán 440 m. v. 24. — Bakonybél videke. A Somhegytől k.-re fekvő gerincen 480 m. v. 23. — Zircz. A pénzeskutmajor felett a Köveshegy oldalán 500 m. v. 23. — Borzavár 440 m. v. 25. — Bakonybél. Kisálmapusztamajor—Porva felé menet egy kis nyires szélén 450 m. v. 25. — A Bocskorhegyen Borzavár és Zircz között (**Dr. Scherm.** 1923. VII. 23).
 12. *Rosa dumetorum* Th. var. *subglabra* Borb. Zircz—Bakonybél közti a Somhegy előtti k.-re fekvő gerincen v. 23. Bakonybél, Gerenczevölgy 370 m. v. 22.
 13. *Rosa urbica* Lem. Borzavár m. (v. 25). Bakonybélből a Köröshegyre menet a Parajos oldalán 440 (v. 24). — Bakonybél, Gerenczevölgy 250—270 m.
 14. *Rosa semiglabra* Rip. Bakonybélből a Köröshegyre menet a Parajos oldalán 400 m. (v. 24).
 15. *Rosa obtusifolia* Desv. Borzavár és Zircz közti a Bocskorhegyen 440 m. — Bakonybélről a Köröshegyre menet a Parajos oldalán 440 m. v. 24.
 16. *Rosa caryophyllacea* Bess. Bakonybél. Kisálmapusztamajorról Porva felé menet 400 m. v. 25. — Zircz, Pénzeskutmajor felé menet a Köveshegyen 500 m. v. 23. — fo. *pedunculis glandulosis* Zircz, Pénzespuszta felé menet a Köveshegy oldala 480 m. v. 23. — Bakonybélről a Köröshegyre menet a Parajos oldalán 440 m. v. 24. — Zircz és Bakonybél közti Somhegytől k.-re fekvő gerincen 480 m.
 17. *R. Győrffyana* Deg. n. sp. Borzavár m. 440 m. v. 25.
 18. *Rosa vinodora* Kern. (fo. *glabrior*) Herend és Bakonybél közti uton (**Dr. Schermann** 1923. VII. 22).
 19. *R. glauca* Vill. (*typica R. Kell.*) A Herend és Bakonybél közti uton (**Dr. Schermann** 1923. VII. 22).
-