

Enumeratio lichenum ad cortices ramulorum Salicis rosmarinifoliae in tractu oppidi Szeged in silva „Alsó Ásotthalmi erdő“ ab Prof. Györfly collectorum et ab me determinatorum.

Lecanora sambuci (Pers.) Nyl.¹ — *Parmelia fuliginosa* (Fr.) Nyl. — *Caloplaca cerinella* (Nyl.) Flag.^{**} — *Xanthoria parietina* (L.) Th. Fr. var. *ectanea* Kickx. — *Rinodina pyrina* (Ach.) Arn. — *Physcia tenella* Bitter.

Omnes hae species arenarum mobilissimarum ubiquistae sunt:

Cladonia subrangiformis f. *subbuliformis* Szat.³ — *Cladonia Magyarica* Wain.²

DR. SZATALA ÖDÖN
(Budapest)

*) Szolnok megyében KARCAGON gyűjtötte ZSÁK Zoltán (SZAT. in Magy. Bot. Lap., 1929, pag. 48).

¹ *Lecanora sambuci* (Pers.) Nyl.

Nagymagyarországból többen (HAZSL., SZATALA, SERVIT, MATCOVICH, SCHULER, NADVORNIK, HRUBY) közölték. Az Alföldről csak egyetlen egy adat ismer-

retes HEVES község környékéről (FÖRISS in Bot. Közl., XXVIII, 1931, pag. 186).

**), Krassó-Szörény megyében FEJÉRDOMB körül körtefán gyűjtötte először SERVIT, M. (SERVIT in Verhandl. u. Mitteil. Siebenbürg. Ver. Naturwiss. Hermannstadt. LXXIX, 1929, pag. 9). UNGVÁR körül gyűjtötte J. NADVORNIK *Robinia pseudoacacia* és *Salix* kérgén (NADV. in Sbornik klubu Prirodved. Brne, XIV, 1931, pag. 2);

patak völgyében és az ANTALOVSKA POLJANA-n. 971 m. magasságban *Aceren* (NADV. in Vestník Král. Ces. Spol. Nauk. II. 1931, pag. 36).

³ *Cladonia subrangiformis* f. *subbuliformis* Szat.

Először SZATALA közölte KECSKEMET környékéről a „NAGY NYIR” homokjáról (SZAT. in „Borbasia”, I, 1928, pag. 6).

véleményem szerint mindkét *Cladonia* az Alföld homokján mindenuit előfordul és közösleges.

² *Cladonia magyarica* Wain.

Az Alföldről először TIMKÓ közölte, KECSKEMÉT: in silva „Bugaci nagyerdő” (TIMKÓ in Sched. ad Flora Hung. exs. VIII. 1927, p. 8).

A FUMANA PROCUMBENS ZÚZMÓTÁRSASÁGA

Irta: Dr. SZATALA ÖDÖN (Budapest.)

Györfly István szegedi professortól feldolgozásra egy küldemény *Fumana procumbens*-t kaptam. Györfly professor a *Fumana procumbens*-eket Bács-Bodrog vármegyében KELEBIA mellett futóhomokon gyűjtötte, és pedig levélbeli szíves értesítése alapján: A KELEBIAI HALAS TAVAK-tól* K-re fekvő, a Δ SKENDER 124 m. t. sz. f. m.-nek jelzett fix ponttól K-re eső „FÖLDI ERDŐ” tisztásán, ahol elvéve *Alkanna tinctoria* és *Euphorbia Cyprissias*, és tömegben *Tortula ruralis* var. *arenicola* volt közé vegyülve. Az élő *Fumana*-k homokból kiálló részeit, közvetlen a homokfelület felett lepte meg a zúzmók különböző faja. Egypár elszáradt *Fumana* fás, homokból kifúj, elszáradt gyökér részleten *Physcia ascendens* Bitter megtelepedéseket is megfigyelhettem. Gyűjtési idő 1939. V. 8.

A meghatároztam anyag duplumit vissza-

küldtem a Szegedi Egyetem Növénytan Intézete herbariumának.

Következő fajokat találtam:

Allarthonia tenellula (Nyl.) B. de Lesd.

Lecanora sambuci (Pers.) Nyl.

Candelariella xanthostigma (Pers.) Lettau.

Parmelia sulcata Tayl.

Caloplaca pyracea (Ach.) Th. Fr.

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. var. *ectanea* (Ach.) Kickx.

Rinodina pyrina (Ach.) Arn.

Physcia ascendens Bitter.

* PRÓDÁN Gyula Bácsbodrog vármegye flórája — Magy. Botan. Lapok 1915 No 5/12, Budapest 1916 művében p. 122 (241) e helyhez mint legközelebb eső pontról: Tompá-ról említi a *Fumana*-t; e Kelebiai „Földi erdő“-t nem említi.