

Pálffy Patrik (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium)

### **A Psinquiry pszichológiai kutatói adatbázis bemutatása**

A Psinquiry egy új, magyar fejlesztésű tudományos adatbázis pszichológus hallgatók és kutatók számára. Az adatbázis lényege, hogy a vizsgálatok során az adatokat feltöltik a rendszerünkbe, és közzé teszik őket. Egy példán keresztül bemutatva: ha egy hallgató felvesz egy 300 fős mintát egy adott kérdőívvel, majd később egy másik hallgató is megteszi ugyan ezt, a második hallgatónak már 600 fős minta áll rendelkezésre.

A rendszer rendelkezik saját adatfelvevő felülettel, mely kiválthatja a Google Űrlapok szolgáltatást, ezen felül plusz funkciókkal is rendelkezik, mint a fordított tételek automatikus megfordítása, illetve gyors, élő elemzések bemutatása grafikonokkal.

Az előadás során két kutatás segítségével, a STAI-T kérdőív magyar változatának pszichometriai vizsgálatán, és a „The Multicultural Masculinity Ideology Scale” magyar adaptációjának létrehozásán, és pszichometriai vizsgálatán keresztül, szeretném bemutatni a Psinquiry működését.

A fejlesztés hosszútávú céljai között szerepel egy online könyvtár létrehozása, mely értékes szakdolgozatokat és szakkollégiumi kutatásokat tartalmazna, amelyek bár publikálásra nem kerülhettek, de jelen adatbázisban hasznos információ forrás lehet.

Rudics Emese (SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

### **Verbális munkamemória funkciók bipoláris zavarban, szkizoaffektív zavarban és szkizofréniában**

Kutatásomban a bipoláris, szkizofrén és szkizoaffektív személyek verbális munkamemóriáját vizsgáltam. A vizsgálat során kitértem a verbális munkamemória egyes alkotórészeire, úgy, mint a fonológiai hurok, komplex verbális munkamemória, illetve az információk hosszú távú memóriából történő felidézésének működésére a három betegcsoportnál.

Kutatásomban 26 fő vett részt, 12 férfi és 14 nő. A minta átlagéletkora 43,54 év volt (SD = 10,54). A vizsgált mintát az előzetes diagnózisok alapján három csoportra osztottam. A bipoláris zavarral küzdők csoportját 9 fő alkotta, a szkizoaffektív csoportot 7 fő, míg a szkizofrén csoport 10 főből állt. A kutatásom során Előre számterjedelem, Fordított számterjedelem, Hallási mondatterjedelem, Betű valamint Kategória fluencia tesztek alkalmaztam. A vizsgált betegcsoportok intelligencia pontszámát Raven-féle Standard Progresszív Mátrix Teszttel mértem fel. Eredményeim alapján, a vizsgált minta esetében nincs szignifikáns különbség a bipoláris, szkizoaffektív és szkizofrén személyek verbális munkamemória teljesítményében, a fonológiai hurok működésében, valamint az információk hosszú távú memóriából történő felidézésének képességében.